

Loratadine + Pseudoephedrine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Loratadine + Pseudoephedrine	LoraPseudo 24h SR tab®	莫鼻卡 24 小時持續性膜衣錠	10/240 毫克/錠

- ◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）
緩解過敏性鼻炎、鼻塞、打噴嚏、流鼻水。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 服藥時請搭配一整杯的水。
 2. 本藥為長效劑型設計，請整顆吞服，不可嚼碎、剝半或磨粉。
 3. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 曾對對本藥任一成分過敏者。
 2. 十四天內同時服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)之病人。
 3. 患有狹角性青光眼、尿滯留、重度高血壓、重度冠狀動脈疾病或甲狀腺機能亢進之病人。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：請保存於室溫(25°C 以下)、陰涼、乾燥處。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 有些人服藥後可能會想睡或頭痛，如要進行需專注力之活動如開車、操作機械等應小心。
 2. 60 歲以上老人比較容易發生副作用，如嗜睡、視力模糊、散瞳、尿液滯留、口乾、便秘、意識混淆、認知改變，請小心使用。
 3. 依文獻報告指出，有患者曾經在服用國外含有 loratadine 和 pseudoephedrine 的長效市售錠片導致食道阻礙和穿孔。因此建議有吞嚥錠片困難或已知食道上部萎縮或食道蠕動異常病史的病患不適用本藥品。服藥時請搭配一整杯的水。
 4. 為避免藥物過量，請勿與其他 OTC (成藥或指示用藥)含有抗組織胺或通鼻劑藥物同時使用。
 5. 服藥期間請避免飲酒。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
過敏反應(如臉、唇、喉嚨腫脹、皮疹、喘息或呼吸困難等)；快速、劇烈或不規則的心跳；原因不明的發燒。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
口乾、排汗增加、嗜睡、咽炎、失眠、頭暈、頭痛、便秘、腸胃不適、尿少、頻尿、殘尿、視力模糊。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/4/17 修訂】

BTC00EA09-02