

Penicillamine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Penicillamine	Metalcaptase®	-	300 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 排除威爾森氏症(Wilsons disease)患者體內多餘的銅離子。
2. 預防胱胺酸尿症(Cystinuria) 引起之結石。
3. 類風濕性關節炎。
4. 重金屬中毒。

◆ **用量與用法：**

1. 請於空腹時吃藥，飯前 1 小時或飯後 2 小時以上服藥。
2. 請與制酸劑、鐵劑、牛奶間隔兩小時使用。
3. 若服用其它藥品，應間隔一小時以上。
4. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥成分或盤尼西林(Penicillin)藥品過敏者。
2. 除非醫師指示，懷孕期間不宜使用。授乳期間不宜使用。
3. 嚴重造血系統功能異常。嚴重腎衰竭。
4. 腎功能不全之風濕性關節炎病人。紅斑性狼瘡病人。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 請多喝水及攝取富含維他命 B6 的食物。
2. 威爾森氏症(Wilsons disease)及胱胺酸尿症(Cystinuria)需 1-3 個月才見效；而用於治療類風濕性關節炎則需 2-3 個月，請保持耐心並按照醫囑服用藥物。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 過敏反應：瘙癢或蕁麻疹，面部或四肢腫脹，口腔或喉嚨腫脹/刺痛，胸悶，呼吸困難等。
 - 不明原因發燒、關節疼痛。
 - 皮膚上出現鱗片狀、紅色或片狀斑塊。
 - 口腔潰瘍。
 - 水腫、血尿或尿液混濁。
 - 異常出血或瘀血。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
胃腸不適(如嘔吐、胃痛或腹瀉)、味覺遲鈍、食慾不振。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/04/17 修訂】

BTC00EA12-02