

Moxifloxacin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Moxifloxacin	Mosflow [®]	摩斯羅膜衣錠	400 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
用於治療成人(18 歲以上)感受性細菌引起的感染症。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 即使感染症狀改善，仍然必須服用完整個療程，未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥。
 3. 若同時有服用制酸劑、綜合維他命(含有鎂、鋁、鐵、鋅製劑)、抗反轉錄病毒藥物(如 didanosine) 和 sucralfate (胃藥的一種)時，至少必須在服用 moxifloxacin 之前 4 小時或之後 2 小時才能再服用，避免併用降低藥效。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 已知對於 moxifloxacin、其他的 quinolones(氟喹諾酮類藥物)或所含其它成分過敏者。
 2. 懷孕和哺乳婦女。
 3. 兒童和小於 18 歲青少年的使用請洽醫師或藥師諮詢。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服用本藥物可能會有暈眩、頭暈、視力改變、疲倦等情形，請避免開車或進行其他危險性的機械操作，直到您已習慣本藥對您的影響。
 2. 本藥可能會使您的皮膚對陽光更加敏感，請注意防曬。
 3. 曾有個案服用後發生嚴重的皮膚反應(Stevens-Johnson-Syndrome 或中毒性表皮壞死症)，服藥後若發生皮膚或黏膜紅腫、起水泡、脫皮，請立即停藥就醫。
 4. 本藥可能罕見地會發生肌腱發炎或撕裂(好發於阿基里斯腱，有時為雙側)，可能在開始使用的 48 小時內很快發生，也曾在治療完成的幾個月後發生，尤其是兒童或成長期青少年、老年人、腎功能不良、曾進行器官移植或同時併用皮質類固醇的病人，應謹慎使用。若腳踝後側、肩膀、手或其他關節出現疼痛、瘀傷或腫脹，請告知醫師。
 5. 本藥罕見地會誘發癲癇或降低癲癇閾值，有癲癇、中風、腦部疾病病史者，請先告知醫師。
 6. 本藥罕見地會影響心臟傳導而造成心律不整，尤其是有心律不整病史、低血鉀、併用會導致心律不整的藥物等，若發生胸悶、胸痛、心悸、心跳過快或過慢等，請立即就醫。
 7. 服用本藥罕見地可能有感官或感覺運動神經異常而導致感覺異常、感覺減退、感覺遲緩或無力。如果正在接受本藥治療發生疼痛、灼熱、刺痛、麻木或無力請告知醫師。
 8. 若您患有重症肌無力，請先告知醫師。服用此藥的重症肌無力病人，可能會加重症狀的惡化，曾經發生過嚴重的呼吸問題。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/04/17 修訂】

Moxifloxacin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Moxifloxacin	Mosflow [®]	摩斯羅膜衣錠	400 毫克/錠

9. 抗生素經常造成腹瀉。在極少數的情況下，會出現稱作困難梭狀芽孢桿菌相關腹瀉的嚴重情形，服藥期間或服用後幾個月都可能會出現。若您感覺胃痛、痙攣或嚴重稀便、水便甚至出現血便，請立即回診就醫。就醫前請勿自行服用任何藥物來止瀉。
10. 服用此類藥物後 2 個月內，心臟外主血管（主動脈）可能發生主動脈瘤或主動脈剝離，尤其是老年人，此副作用的原因不明。若您的腹部、胸部或背部突然疼痛，而且情況嚴重且並未停止，請立即就醫
11. 若已懷孕、計畫懷孕或有心、肝、腎疾病、低血鉀、癲癇、糖尿病、腦部疾病、主動脈瘤（最大動脈壁膨出）、心律不整（包括延長的 QT 間隔）、精神病、重症肌無力、慢性支、氣管炎、鼻竇炎等疾病病史，請告知醫師。
12. 有使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)請先告知醫師。特別是紅黴素、抗凝血劑、胰島素或口服糖尿病藥物、抑鬱症或精神疾病藥物、抗心律不整藥、疼痛或關節炎藥物、類固醇藥物。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 嚴重過敏：蕁麻疹；皮膚疹、起泡、脫皮；臉或手部腫脹；嘴或喉嚨腫脹或刺痛、吞嚥困難；胸悶、呼吸困難。
 - 肌腱炎或肌腱撕裂(可能在治療後數月發生)：腳踝後側、肩膀、手或其他關節出現疼痛、瘀傷或腫脹。
 - 心律改變(延長心電圖的 QT 間隔時間)：胸悶、胸痛、心悸、心跳過快或過慢。
 - 週邊神經異常：感覺異常；手臂、雙手、雙腿或雙腳出現燒灼、麻木、刺痛感、疼痛或無力感。
 - 情緒或行為改變、癲癇發作或頭部壓力增加：焦慮症、噩夢、睡眠困難、視力變化、頭昏、意識惑亂、感到緊張或易怒、感到焦躁、幻聽幻覺、出現新行為或更糟糕的行為或情緒改變，例如感到沮喪或有自殺的想法、癲癇發作或重度頭痛。
 - 肝功能異常：疲倦、食慾降低、胃部不適或胃痛、噁心嘔吐、尿液顏色變深、大便淡色、皮膚或眼睛泛黃。
 - 腎功能異常：排尿量改變、無法排尿、血尿、水腫或體重大幅增加。
 - 高血糖或低血糖的症狀：呼吸中帶有水果氣味、頭昏、呼吸急促、心動過速、意識惑亂、嗜睡、感覺虛弱無力、潮紅、頭痛、口渴感或飢餓感增強、頻尿、顫慄或出汗。
 - 發燒、寒顫或喉嚨痛；任何無法解釋的瘀傷（青腫）或出血；或感到非常疲倦或虛弱。
 - 持續且嚴重的突發性腹痛、胸痛或背痛。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

胃腸不適、噁心、腹瀉、頭痛、頭暈、味覺改變。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/04/17 修訂】

BTC00EC05-02