

Azithromycin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Azithromycin	Zithromax®	日舒錠	250 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
革蘭氏陽性、陰性及厭氧菌引起之下呼吸道感染(支氣管炎及肺炎)、皮膚及軟組織感染、中耳炎、上呼吸道感染和性傳染病。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 含鋁、鎂制酸劑會影響本藥吸收，建議間隔至少兩小時使用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 已知會對 azithromycin、erythromycin(紅黴素)或其他巨環類抗生素、或產品中任何非活性成分產生過敏症狀的患者。
 2. 曾有本藥品引起的肝臟疾病病史。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 治療期間若無醫師指示，請勿自行停藥，即使症狀已好轉，也應繼續服藥直到整個療程結束，以避免抗藥性產生。
 2. 本藥品會與部分藥品產生交互作用，請將您正在服用的藥品(含處方藥及非處方藥)告知醫師，尤其是制酸劑、麥角類藥品、免疫抑制劑、強心劑、抗病毒藥、抗癲癇藥、抗凝血劑、心律不整藥品。
 3. 本藥曾有重症肌無力症狀惡化的通報案例，若您出現肌肉虛弱或更加惡化、咀嚼或吞嚥困難、呼吸困難、眼瞼下垂，或是視力變化，如視覺模糊或重影(眼花)等現象，請立即回診。
 4. 若有懷孕或授乳、腎臟疾病、肝臟疾病、心臟疾病、心律不整、心臟衰竭、重症肌無力之情形，請務必告知醫師。
 5. 若有嚴重、持續性甚至出血性腹瀉，請告知醫師。未經醫師指示，切勿自行服用止瀉藥。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 過敏反應(如臉、唇、喉嚨腫脹、皮膚搔癢、紅疹、蕁麻疹、呼吸困難、原因不明發燒等)。
 - 胸痛或胸悶、心動過速或心跳異常。
 - 肝功能變化(如深色尿、灰白色糞便、皮膚或眼白泛黃等)。
 - 嚴重腹瀉並伴有血便、胃痙攣甚至發燒。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
 - 頭痛、腸胃不適、噁心嘔吐、腹瀉。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/4/18 修訂】

BTC00EC07-02