

Enzalutamide tab 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Enzalutamide	Xtandi®	安可坦膜衣錠	40 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

治療前列腺癌。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 膠囊應以水整粒吞服，不咀嚼、不溶解或不打開，可隨餐或空腹服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對活性成份或賦形劑清單中所列任一賦形劑過敏。

2. 禁止孕婦或可能懷孕的婦女使用。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

如果錯過平常服用 Xtandi 的時間，應盡快補服處方劑量。如果錯過了一整天的劑量，應於第二天以一般每日劑量恢復治療，切勿服用 2 倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 室溫 30°C 以下儲存，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 本藥含有山梨醇(sorbitol)，果糖不耐症的病人不可使用。

2. 曾有痙攣發作病史、腦外傷、中風、原發性腦腫瘤或腦轉移，需事前告知醫師。

3. 若與懷孕或計畫懷孕的女性伴侶有性行為，於治療時及治療後三個月都必須進行避孕措施。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

發生喪失意識或痙攣或對此產品發生全身性過敏反應。

極少數病患發生可逆性後腦病變症候群，注意其表徵如：可能有或無伴隨高血壓之痙攣、頭痛、視覺喪失、神經障礙或混亂，出現以上症狀請立即就醫。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

無力、疲勞、熱潮紅、頭痛、焦慮、高血壓、肌肉及骨骼疼痛、四肢感覺異常、不寧腿症候群、跌倒及非病理性骨折、男性女乳症。