




### Methotrexate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Methotrexate	Methotrexate®	滅殺除炎錠	2.5 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
用於牛皮癬、牛皮癬性關節炎、類風濕性關節炎、部分自體免疫疾病、其他發炎性關節炎、固體腫瘤，白血病等

- ◆ **用量與用法：**

1. 本藥品不需要每天服用，請參考醫師指示。
2. 請遵循醫師處方與指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

	Methotrexate 滅殺除炎錠		Folic acid 葉酸
			
	早	晚	早
星期一	_____顆	_____顆	_____顆
星期二	_____顆	_____顆	_____顆
星期三	_____顆	_____顆	_____顆
星期四	_____顆	_____顆	_____顆
星期五	_____顆	_____顆	_____顆
星期六	_____顆	_____顆	_____顆
星期日	_____顆	_____顆	_____顆

- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用，每七天劑量不可超過當周總劑量

- ◆ **藥品儲存：**

請儲存於 25°C 以下室溫、避光、乾燥處。並置於孩童接觸不到的地方。

- ◆ **使用前須告知醫生的事項：**

1. 您的藥物過敏史、過敏症狀、及所有用藥項目(包含處方藥、非處方藥、健康食品、維他命)
2. 若您有以下的健康問題應先告訴醫師：肝臟疾病(如肝炎、B 肝、C 肝)、骨髓疾病(如白血球記數偏低、血小板數目減少、貧血等)、酒癮、免疫系統低下、半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酶缺乏症或葡萄糖/半乳糖吸收不良。
3. 若您正在懷孕中、或是與伴侶目前有準備懷孕的計畫，應在 3-6 個月前告知醫師。
4. 若您正以母乳哺育幼兒，應於使用前告知醫師。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/04/17 修訂】

BTC00ED03-02

## Methotrexate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Methotrexate	Methotrexate <sup>®</sup>	滅殺除炎錠	2.5 毫克/錠

### ◆ 使用本藥品的注意事項：

1. 告知所有你的醫療照護者您正在服用此藥。
2. 使用本藥品時需要時常抽血檢驗數值，用於監測藥物的副作用及療效，請務必配合。
3. 服用此藥期間請勿飲酒，以免造成肝臟負擔。
4. 建議使用防曬乳液及採用物理性防曬(外套、太陽眼鏡等)。
5. 服用本藥刷牙時請使用軟毛牙刷、避免受傷。
6. 服用此藥後您有較高機率可能受到感染，應經常洗手、採取自我保護措施、遠離受感染、感冒或流感的人，並注意勿憋尿、維持私密處衛生清潔，降低感染機會。在服藥前後也應洗手注意衛生。
7. 若您有同時服用以下藥品，可能會影響本藥品的療效，若同時服用應告知醫療人員：  
aspirin(伯基)、phenytoin (癲能停)、theophylline (漢喘、善寧)、cisplatin (克莫抗癌)、diclofenac(服他寧)等止痛劑、及其他免疫抑制劑。
8. 在施打疫苗前，請先告知您的醫師你有服用此藥。本藥品與疫苗同時使用，可能提高受感染的機率或使疫苗效果減弱。
9. 建議您定時定量補充水分，避免過度出汗等體液損失，若有大量嘔吐、腹瀉、頻繁口渴，應告知您的醫生。
10. 服用本藥可能會發生一些少見但嚴重的副作用，若發生應尋找醫療協助(下述)。

### ◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

如發生以下症狀時，請立即就醫

1. 皮疹、蕁麻疹、皮膚發癢、發紅，且可能伴隨有發燒情形。胸口或喉嚨緊繃、呼吸喘、難以呼吸、吞嚥困難等。或嘴巴、臉部、嘴唇、喉嚨腫脹。
2. 發燒、發冷、嚴重喉嚨痛、耳朵或鼻竇疼痛、咳嗽、多痰或痰液顏色變化、排尿疼痛、口瘡或傷口難以癒合。
3. 咳血、類似咖啡渣的嘔吐物、血尿、血便、黑便、牙齦出血、陰道異常出血、無原因的出現瘀青或瘀青變大、或任何您無法止血的出血。
4. 嚴重胃痛、嚴重背痛或嚴重胃部不適或嘔吐。
5. 無法排尿、排尿量改變、體重大幅增加。
6. 深色尿、異常疲倦、沒有飢餓感、糞便顏色變淺、嘔吐、皮膚或眼睛變黃
7. 異常燒灼、麻木或刺痛感、虛弱無力、身體麻痺。
8. 嚴重暈眩或失去知覺、嗜睡、視力改變、骨骼疼痛、嚴重頭痛、頸僵硬

如以下症狀持續且令您困擾時，請告知醫師

噁心或嘔吐、無飢餓感、掉頭髮、感覺頭暈、疲倦或虛弱、胃痛、感冒症狀。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/04/17 修訂】

BTC00ED03-02