

## Pilocarpine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Pilocarpine	Salicret®	液泌快膜衣錠	5 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療因放射線治療或 Sjogren's syndrome 引起的口乾燥症。

◆ **用量與用法：**

1. 避免與高脂肪食物併服，可能會導致藥品吸收減少。

2. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 曾對本藥成分有過敏反應者。

2. 有閉角性青光眼、虹膜炎、未控制之氣喘患者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 15~30°C，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 本藥可能導致視力模糊或夜視能力變差，在確認藥效作用前，應避免駕車，從事危險性工作也應小心。

2. 本藥可能有出汗副作用，過度出汗會導致脫水，服藥期間應適時補充水分以防止體液流失。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 過敏反應(如臉、唇、喉嚨腫脹、皮膚搔癢、紅疹、蕁麻疹、呼吸困難、原因不明發燒等)
- 心跳過快、過慢或不規則
- 頭痛、暈眩、意識模糊、顫抖

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

- 視力模糊
- 噁心、嘔吐、腹瀉
- 冒汗
- 頻尿
- 淚液分泌增加

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/4/17 修訂】

BTC00EE05-02