

## Captopril 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Captopril	Ceporin®	血樂平錠	25 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療高血壓：可使血流順暢，要長期且按時服用，才能確保療效。
2. 治療心衰竭和心肌梗塞後左心室功能不全。
3. 糖尿病引起的腎病變。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 食物會降低本藥的藥效，請於飯前 30 分鐘服用。
3. 與制酸劑併服會影響本藥藥效，若需服用制酸劑，請於服用本藥前 2 小時或後 1 小時服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其他同屬於血管收縮素轉化酵素抑制劑類(angiotensin converting enzyme inhibitor)藥物過敏者。
2. 原發性或自發性的血管水腫疾病。
3. 懷孕婦女。
4. 雙邊腎動脈狹窄症患者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：請置於室溫 (30°C 以下)，謹防溼氣瓶蓋需緊鎖。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩。請勿開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
2. 若服藥期間發現懷孕，應立即停藥，並儘速就醫。
3. 計畫懷孕、哺乳的婦女、有心臟、肝、腎疾病病史者，請告知您的醫師。
4. 本藥可能會導致血中的鉀離子過高，應多注意且控制含鉀鹽食物(如代鹽)的攝取，可先請教醫師或營養師。
5. 自行停藥可能會導致病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。
6. 請定期測量血壓、脈搏速率及注意身體狀況，以作為醫師調整藥物的依據。
7. 請定期至醫院就診及檢查，以確保藥物療效及用藥安全。
8. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及適度的運動來控制血壓。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
皮膚癢或紅疹、臉部四肢水腫、呼吸或吞嚥困難、聲音嘶啞、昏厥、發燒、喉嚨痛。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
乾咳、頭痛、頭暈、噁心、疲倦感、腹瀉、味覺改變。