

Carbamazepine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Carbamazepine	Carpine®	卡賓錠	200 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 控制癲癇症。
2. 治療三叉神經痛、原發性舌咽神經痛或神經病變疼痛。
3. 治療雙極性疾患。
4. 治療腎原性尿崩症。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、服藥時間或突然停藥，因突然停藥可能導致痙攣或癲癇發作。
2. 此藥為口服之長效釋放錠，可以撥半與水吞服，但請勿咬碎或磨粉。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品成分過敏。
2. 房室阻斷。
3. 有骨髓機能降低、肝性紫斑沉著症病史。
4. 正在服用單胺氧化酶抑制劑，如 Eutac®(憂停膜衣錠)。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 若忘記服藥，想起時儘快服用；若想起時已接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 室溫 30°C 以下，陰涼乾燥處儲存。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服藥期間請勿吃葡萄柚或飲用葡萄柚汁以及含酒精之飲料，以免影響藥物代謝。
2. 服藥期間避免喝酒或自行突然停藥，突然停藥可能導致痙攣或癲癇發作。
3. 服用此藥可能造成頭暈、嗜睡、視線模糊，特別在治療初期與劑量調整時，請勿開車或操作危險機械等須高度警戒之工作，除非您已習慣此藥對您的影響。
4. 使用本藥可能會引起運動失調、頭暈、嗜睡、低血壓、混亂狀態而導致跌倒、骨折或其它傷害，骨質疏鬆病人、老年人、或同時服用骨骼肌鬆弛劑、鎮靜安眠藥等高風險病人，應注意預防跌倒。
5. 服用此藥曾發生極罕見的嚴重皮膚不良反應，包括史蒂文生強生症候群及毒性皮膚壞死，若用藥後發生喉嚨痛、口腔潰瘍、眼睛癢、皮膚紅疹、起水泡等應立即停藥並回診。
6. 本藥治療期間偶爾發生暫時或持續性的血小板或白血球數目減少，若發生發燒等感染症狀、容易瘀傷、出現紫點或出血性紫斑的現象，應立即回診。
7. 本藥會降低避孕藥的效果，服藥期間請採取其他避孕措施。
8. 許多藥品會影響本藥之藥效，請勿自行服用任何藥品，應與醫師討論確認後再使用。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2025/04/18 修訂】

BTC00EG04-02

Carbamazepine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Carbamazepine	Carpine®	卡賓錠	200 毫克/錠

9. 甲狀腺功能低下、高眼壓、尿滯留患者服用此藥可能加重其症狀，應事先告知醫師。
10. 孕婦、計畫懷孕或授乳的婦女，請於開始服藥前告知醫師。若於服藥期間懷孕，請務必告知您的醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
皮膚過敏、發熱、喉嚨痛、口腔潰瘍、不正常出血或瘀血。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
頭痛、頭暈、嗜睡、視覺模糊、眼球震顫、噁心、嘔吐、水腫。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2025/04/18 修訂】

BTC00EG04-02