

## Morphine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Morphine	Morphine <sup>®</sup>	硫酸嗎啡錠	15 毫克/錠
Morphine sulfate PR cap	MST <sup>®</sup>	嗎啡長效膜衣錠	30 毫克/錠
Morphine sulfate	Morphine sulfate oral solution	硫酸嗎啡口服液	2 毫克/毫升，60 毫升/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 緩解中至重度疼痛或心肌梗塞之疼痛。
2. 解除癌症末期病患之重度疼痛。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
2. MXL<sup>®</sup> 默痛舒持續性膠囊，請整粒膠囊吞服。無法整粒吞服者可打開膠囊，但不可壓碎或嚼碎其小顆粒。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對嗎啡或其所含賦形劑過敏者。
2. 顱內壓過高之患者、頭部損傷者、腦部有腫瘤者。
3. 嚴重中樞神經抑制者。嚴重的呼吸抑制者。
4. 懷疑或是患有腸道麻痺或阻塞患者。膽管術後。
5. 嚴重肝功能障礙。急性酒精中毒者。
6. 與單胺氧化酶抑制劑(MAOI)一起使用，或在 14 天內有使用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)。
7. 痙攣狀態者。
8. 懷孕婦女(需長期使用或近分娩前的高劑量使用)。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用，若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥應避免和酒精或中樞神經抑制劑(安眠、過敏、感冒藥等)併服，因會增加中樞神經方面的副作用，如嗜睡。
2. 本藥可能會導致嗜睡、頭昏、暈眩，尤其是初次服用。不要開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
3. 長期服用本藥可能會發生便秘的情形，多吃富含纖維素的食物及適度的運動可幫助改善，若仍不能改善，可與醫師討論是否需要使用軟便劑或瀉劑。
4. 長期服用本藥，可能會有耐受性發生，若覺得藥效降低，請回診與醫師討論，切勿自行增加劑量。停用本藥品也須慢慢降低劑量，以避免戒斷現象發生。
5. 長期服用本藥可能會引起性腺和腎上腺皮質功能低下及高泌乳素血症，而導致不孕。如果您打算生育，請與您的醫師討論。
6. 使用嗎啡會面臨成癮、濫用和誤用的風險，可能導致用藥過量和死亡。請務必遵循醫師指示服用。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/4/17 修訂】

BTC00EH14-02

## Morphine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Morphine	Morphine®	硫酸嗎啡錠	15 毫克/錠
Morphine sulfate PR cap	MST®	嗎啡長效膜衣錠	30 毫克/錠
Morphine sulfate	Morphine sulfate oral solution	硫酸嗎啡口服液	2 毫克/毫升，60 毫升/瓶

7. 意外攝入嗎啡，尤其是兒童，會導致致命的嗎啡過量。應將藥品放在孩童拿不到的地方。
8. 懷孕期間長時間使用嗎啡會導致新生兒鴉片類藥物戒斷症候群，如果不加以識別和治療，可能會危及生命。如果孕婦需要長時間使用鴉片類藥物，請諮詢醫師新生兒鴉片類藥物戒斷症候群的風險，並確保可獲得適當的治療。
9. 進行需麻醉的手術前，請告知醫師您正服用此藥。
10. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳、有心臟血管、肝、腎疾病、癲癇、精神方面的疾病、對麻醉劑成癮等疾病病史，請告知醫生。
11. 有使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)請先告知醫師，尤其是抗憂鬱藥及治療偏頭痛的藥品。

### ◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

#### 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 嚴重過敏：蕁麻疹、臉或手腫脹、嘴唇或喉嚨腫脹、胸悶、呼吸困難。
- 過量：嗜睡、針點狀瞳孔、骨骼肌鬆弛、心搏徐緩、呼吸抑制、低血壓、木僵及昏迷、循環衰竭。
- 血清素症候群：躁動、幻覺、心跳加快、發燒、大量出汗、發抖或抖動、肌肉抽搐或僵硬、協調困難、噁心、嘔吐或腹瀉。

#### 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

- 頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、搔癢、潮紅、低血壓、呼吸不正常或短促、情緒鬱悶或改變、視力模糊、肌肉不受控制的震顫、過度興奮或安靜(特別是兒童)。
- 腎上腺功能不全：噁心、嘔吐、食慾不振、疲倦、虛弱、眩暈或低血壓。
- 性激素濃度減少：性慾低下、陽萎、勃起功能障礙、無月經或不孕。