

## Ibuprofen 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ibuprofen	Ibuprofen® "Honten"	伊普錠	400 毫克/錠劑
Ibuprofen oral suspension	Mac Safe® suspension	馬蓋先 口服懸濁液	20 毫克/毫升；60 毫升/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 慢性風濕性關節炎、關節炎、關節痛、神經炎、神經痛、外傷、手術後之消炎、鎮痛。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
2. 舒抑痛口服懸液服用前請先搖勻。
3. 飯後服用可以減少胃腸道不適的副作用。
4. 大於 12 歲兒童及成人每日最大劑量不建議大於 2400 毫克(伊普錠 6 錠)。
5. 6 個月至 12 歲兒童每日最大劑量不建議大於每公斤體重 40 毫克(舒抑痛 2 毫升)。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品、其他非類固醇止痛消炎藥或 Bokey® 伯基腸溶微粒膠囊過敏或服用後發生氣喘者。
2. 進行冠狀動脈繞道手術後 10-14 天內不可使用本藥。
3. 嚴重肝衰竭或腎衰竭病人。
4. 消化性潰瘍、出血或穿孔。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥避免和含有酒精成分的飲料併服。
2. 使用本品可能發生罕見但嚴重之皮膚不良/過敏反應，如用藥後發生喉痛、口腔/黏膜潰爛、皮疹等症狀，應考慮可能為藥品不良反應，宜立即就醫並考慮停藥。
3. 長期使用非類固醇止痛消炎藥者，可能會增加心血管栓塞的風險，尤其是需要使用高劑量 ibuprofen (每日用量 2400 毫克) 的病人。非必要請勿長期服用。服藥期間請注意心血管栓塞的症狀，如胸悶、胸痛、呼吸困難、單側肌肉無力、嚴重頭痛、視力模糊、說話困難、下肢腫脹疼痛等。
4. 本藥可能會導致水份滯留及水腫情形，心臟衰竭之病人應謹慎使用本藥。
5. 孕婦及授乳婦女之用藥安全性尚未確立，因此不建議使用。
6. 需長期使用的病人應定期回診監測肝、腎功能和血液檢查。
7. 有使用任何藥物，含處方藥、非處方藥、中草藥，請先告知醫師，尤其是抗凝血藥、降血壓藥、利尿劑、鋰鹽、免疫抑制劑 Methotrexate。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/4/18 修訂】

BTC00EH21-02

## Ibuprofen 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ibuprofen	Ibuprofen® "Honten"	伊普錠	400 毫克/錠劑
Ibuprofen oral suspension	Mac Safe® suspension	馬蓋先 口服懸濁液	20 毫克/毫升；60 毫升/瓶

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

全身性過敏、臉部或腳部因蕁麻疹腫脹、呼吸急促或不規則、胸口悶痛、心跳變快或不規律、不尋常出血、血便或黑便、眼睛或皮膚變黃、排尿量變少。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、耳鳴、噁心、嘔吐、腹部或胃灼熱或絞痛、下痢、胃部不快感。