

Allopurinol 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Allopurinol	SYNORID®	欣律錠	100 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 1. 治療與預防痛風發作、痛風性關節炎、尿酸結石、癌症或經化學治療產生之高尿酸血症。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 飯中或飯後服用可減少胃腸不適的副作用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥或其賦形劑過敏者。
 2. HLA-B * 5801 基因的攜帶者(嚴重的皮膚不良反應風險顯著增加)。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服用本藥應避免和含有酒精成分的飲料一起服用，酒精會增加尿酸的形成且會降低藥物的療效。
 2. 服用本藥品期間若過量服用維他命 C，會使尿液酸化，增加腎結石的風險，因此應注意並限量攝取維他命 C 及多喝水。
 3. 服用本藥後可能會發生嗜睡、頭昏、暈眩。避免開車、操作機械或從事危險性高的動作。
 4. 服用本藥須定期至醫院就診及抽血檢查(如尿酸值、全血球數、凝血時間等)，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。
 5. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳、有過敏、心血管疾病、高血壓、肝、腎或糖尿病、心衰竭、癲癇發作或癌症(包括多發性骨髓瘤)等其他疾病病史，請告知醫師。
 6. 使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)之前請諮詢醫師或藥師。特別是正在服用抗凝血藥(如 Coumadin®可邁丁錠、Orfarin®歐服寧錠)、抗癌藥(如 Endoxan® 癌德星錠、Imuran®移護寧錠等)、抗生素(如 Amoxicillin®安莫西林膠囊)、ACE inhibitor(如 Tritace®心達舒錠等)或茶鹼、利尿劑等其他處方或非處方的用藥，請告知醫師。
 7. 服藥初期，因體內尿酸濃度波動，痛風可能會再次發作，此為正常現象。因此沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。
 8. 使用含 allopurinol 成分藥品後可能引起嚴重皮膚反應：
 - (1) 在出現皮疹或過敏反應的最初跡象時 如發生喉嚨痛、嘴破(口腔潰瘍)、眼睛不適、皮膚紅疹等症狀，應考慮可能為本藥之不良反應，應儘速就醫或回診原處方醫師，並告知醫師正在服用本藥。
 - (2) 使用含 allopurinol 成分藥品若曾發生任何不良反應，請主動告知您的醫師。

Allopurinol 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Allopurinol	SYNORID®	欣律錠	100 毫克/錠

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

過敏。起泡，脫皮，紅疹。尿色深或大便白，食慾不振，胃痛，噁心，嘔吐，皮膚或眼睛發黃。排尿時疼痛，尿液混濁或流血，排尿量或排尿頻率改變。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

腹瀉。嗜睡。