

Bumetanide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Bumetanide	Busix®	必得寧錠	1 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 - 1 與充血性心衰竭，肝腎疾病，包括腎病症候群相關的水腫。
 - 2 高血壓。
- ◆ **用量與用法：**
 - 1 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 - 2 可隨餐服用來減輕腸胃不適。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 - 1 對本藥、其所含賦形劑、sulfonamides 類藥品(如 Baktar® 撲菌特錠)過敏者。
 - 2 持續無尿。
 - 3 肝性腦病變病人，包括昏迷。
 - 4 嚴重電解質流失。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 - 1 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 - 1 儲存環境：25°C 以下，避光、避濕及避熱。
 - 2 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服用本藥避免和含有酒精成分的飲料一起服用，否則會增加藥品的副作用。
 2. 服用本藥後可能會發生嗜睡、頭昏、暈眩。避免開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
 3. 本藥為利尿劑，服用藥物後會增加排尿次數，為避免影響睡眠品質，除非醫師有特別指示，請於晚上 6 點前服用。
 4. 服藥後可能會有姿勢性低血壓情形發生，即從坐姿或躺姿站起來時，會有頭暈目眩的情形。因此站起來時，應儘可能的放慢速度。
 5. 本品含有乳糖作為賦形劑，患有罕見遺傳性疾病如半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酶缺乏或葡萄糖-半乳糖吸收不良之病人不得使用本藥劑含有乳糖作為賦形劑，患有罕見遺傳性疾病如半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酶缺乏或葡萄糖-半乳糖吸收不良之病人不得使用本藥。
 6. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳、有心血管疾病、肝、腎功能不良、胰臟炎、糖尿病、痛風或紅斑性狼瘡等其他病史，請告知您的醫師。
 7. 正在使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)請先告知醫師。特別是其他利尿劑、抗凝血劑(warfarin)、毛地黃、鋰鹽。
 8. 請定期至醫院就診及檢查，以維持體內電解質的平衡及定期監測腎功能，以確保藥物療效及用藥安全。

Bumetanide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Bumetanide	Busix [®]	必得寧錠	1 毫克/錠

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

嚴重過敏。皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮（無論有無發燒）；眼睛發紅或刺激；嘴部、喉嚨、鼻子或眼睛出現潰瘍。電解質異常、肌肉痙攣。排尿困難、發燒、發冷、一側或腰部疼痛。聽力下降或耳鳴。頭暈或昏厥。嚴重腹瀉或胃痛。異常出血或瘀傷。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

口乾、視力模糊、頭痛、胃痙攣、胸痛、食慾不振、噁心、嘔吐、性功能障礙。