

## Loperamide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Loperamide	Imolex <sup>®</sup>	依莫瀉膠囊	2 毫克/膠囊

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療嚴重急性或慢性腹瀉。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其賦形劑過敏者。

2. 腹部疼痛但無腹瀉之病患。

3. 2 歲以下的兒童。

4. 急性痢疾(痛性腹瀉，糞便常有粘液或帶血)、急性結腸炎、細菌性腸炎、偽膜性腸炎。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 治療嚴重急性腹瀉：不再腹瀉時，則可立即停藥。

2. 治療慢性腹瀉：想起時儘快補服，但若沒有腹瀉的情形了，則不用補服，並按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥應避免和酒精併用，否則會增加頭昏、眩暈之副作用。

2. 應盡量充份攝取水分以補充因腹瀉造成的水分流失。

3. 服用本藥後可能會發生頭昏、暈眩的情形。不要開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。

4. 若服藥 2 天後腹瀉未停止或有發燒情形，請回診請醫師重新評估。

5. 若腹瀉同時伴有高燒或血便，除非醫師指示，請勿自行服用本藥。

6. 慢性腹瀉者長期服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。

7. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳中的婦女、有肝臟疾病或腸胃道方面疾病等或其他病史，請告知您的醫師。

8. 若您正在服用麻醉性止痛藥、抗生素(Erythromycin<sup>®</sup>紅黴素硬脂酸鹽錠、Tetracycline<sup>®</sup>鹽酸四環黴素膠囊、Clindamycin (Lindacin)<sup>®</sup>利達信黴素膠囊等)或其他處方和非處方的用藥，請告知您的醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請停藥立即就醫

過敏、皮膚紅疹、發燒、血便、嚴重腹部疼痛伴隨有噁心和嘔吐、呼吸困難。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

腹痛、噁心、嘔吐、脹氣、便秘或腹瀉、疲倦、喪失活力、暈眩、嗜睡、口乾。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/4/17 修訂】

BTC00EK11-03