

## Edoxaban tosilate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Edoxaban tosilate	Lixiana®	里先安膜衣錠	30 毫克/錠
			60 毫克/錠

◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

1. 預防非瓣膜性心房纖維顫動的病人發生中風及全身性栓塞。
2. 治療深層靜脈栓塞及肺栓塞。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 如果您無法完全吞服藥錠，可將其壓碎混合於水中或蘋果泥中，立即口服。
3. 若需經鼻胃管餵食，可以將其壓碎後懸浮於少量水中，立即經鼻胃管給藥，之後並以水沖洗鼻胃管。
4. 壓碎的里先安膜衣錠在水和蘋果泥中可以穩定達 4 小時，請於 4 小時內使用完畢。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其所含賦形劑過敏者。
2. 重大且正在發生之出血。
3. 肝臟疾病併凝血功能障礙且有出血風險。
4. 患有重大出血風險疾病。
5. 控制不佳之嚴重高血壓。
6. 同時接受任何其他抗凝血劑的治療。
7. 懷孕及哺乳。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起實應立即補服，並於隔天按照醫師指示用法繼續用藥。不得於同一天服用兩倍的處方劑量做為彌補漏服的劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：儲存於 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥會增加出血風險，對於出血風險較高的病患，建議應謹慎使用。發生嚴重出血時，請立即回診就醫。
2. 開始本藥治療前應進行肝功能檢測。接受治療超過 1 年的病患，建議定期監測肝功能。輕度或中度肝功能不全病患應謹慎使用，重度肝功能不全病患不建議使用。
3. 看診時請告知醫師或牙醫師您目前正使用此藥，特別是手術或拔牙前，最好在手術或拔牙前至少 24 小時前停用。手術或治療完成且適當的止血後，應儘快重新使用本藥。
4. 接受過任何一種脊椎或硬脊膜外手術的病患若服用此藥物，沿脊椎周圍發生出血問題的機

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2025/4/17 修訂】

BTC00EL10-02

## Edoxaban tosilate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Edoxaban tosilate	Lixiana®	里先安膜衣錠	30 毫克/錠
			60 毫克/錠

率會增大。雖然出血症狀極為罕見，但它可能會進一步導致長期或永久性肢體麻痺(無法移動身體某些部位)，在接受脊椎或硬脊膜外手術前，請告知醫師您使用此藥。若您出現任何神經疾患的跡象，如背痛、麻木或刺痛感、肌肉虛弱無力、麻痺、大小便失禁，請立即停藥就醫。

- 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量，因可能會增加您罹患心肌梗塞、血液凝塊或血栓的風險。若必須暫時停用，要儘快重新開始。
- 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳、有腎臟疾病、肝臟疾病、出血問題、脊柱疾病、抗磷脂綜合症、心臟瓣膜疾病、人造心臟瓣膜或背部手術史、接受心臟整流術(cardioversion)等，請告知醫師。
- 有使用任何藥物，如處方藥、非處方藥、維他命、中草藥等，尤其是抗心律不整藥、抗生素、抗黴菌藥、非類固醇消炎止痛藥、精神科藥物(SSRI、SNRI)，請先告知醫師。
- 服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。

### ◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

#### 1. 如發生以下症狀時，請停藥立即就醫

- 過敏：蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- 出血症狀：嘔血或咳血；似咖啡渣的嘔吐物；血尿；黑色、紅色或黑便；牙齦出血；陰道異常出血；無理由出現瘀傷或瘀傷變大；或者您無法止住的出血。
- 中風徵兆：身體某一側虛弱無力、說話或思維困難、平衡感改變、臉部某一側下垂或視力模糊。
- 脊椎損傷：背痛、麻木或刺痛感、肌肉虛弱無力、麻痺、大小便失禁。
- 突然或劇烈頭痛、噁心、意識模糊。

#### 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭暈、頭痛、噁心、腹痛、搔癢、皮疹、肝功能檢查值異常。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2025/4/17 修訂】

BTC00EL10-02