

## Mometasone furoate 鼻噴製劑衛教單張

商品名	中文名
Momenase®	樂鼻寧水性鼻用噴液劑

### ◆ 組成：

一次劑量含類固醇 mometasone furoate 50 mcg，每瓶含 140 次劑量。

### ◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 季節性或常年性過敏性鼻炎。
2. 輕度到中度鼻息肉之相關症狀。

### ◆ 用量與用法：

請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

本品為懸浮液，使用前請充分搖勻。

#### 藥液充填：

1. 第一次使用：先搖勻，按壓噴頭 10 次或直到觀察到均勻噴霧。
2. 14 天或 14 天以上未使用：搖均勻，按壓噴頭 2 次直到觀察到均勻噴霧。

#### 使用方式：

1. 使用前充分震搖藥瓶。
2. 將鼻子擤乾淨，頭部向前微傾，使噴霧劑瓶朝向鼻後腔(勿朝向鼻中隔)
3. 以手指壓住另一個鼻孔，另一手大拇指支撐瓶底，食指和中指壓住瓶身白色的頸部，充分一次壓到底，噴完後自此鼻孔輕輕吸氣，另一個鼻孔則重複相同動作。
4. 如果每個鼻孔須噴一次以上，則重複上個步驟。
5. 用畢後，以乾的面紙擦拭噴嘴後，將瓶蓋置回噴霧劑瓶上。
6. 給藥後 15 分鐘內，請勿擤鼻涕。

#### 噴頭的清潔：

1. 每次用畢後，以乾的面紙擦拭噴嘴。
2. 定期沖洗噴頭：取下藍綠色瓶蓋，輕輕自白色頸部將噴頭拔起，與藍綠色瓶蓋一起用冷水沖洗。待乾後將其裝回原位。

### ◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

對 mometasone furoate 或產品的任何其他成分過敏。

### ◆ 忘記服藥時該如何處理？

想起時儘快使用；若接近下次用藥時間，按時使用下次劑量即可，不可使用兩倍劑量。

### ◆ 藥品儲存：

1. 不使用時，請保持瓶子密閉。
2. 請儲存於密閉容器室溫(25°C)下，避光、避熱、避濕。
3. 紀錄使用的噴霧劑數量。使用 140 次噴霧後，將藥瓶丟掉。即使瓶中還剩一些藥。
4. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

### ◆ 注意事項：

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/04/17 修訂】

BTC00EO04-02

## Mometasone furoate 鼻噴製劑衛教單張

商品名	中文名
Momenase®	樂鼻寧水性鼻用噴液劑

1. 可能要 2 個星期才能充分顯現療效。
2. 若病患有中度或嚴重的季節性過敏性鼻炎症狀病史，欲使用本品作預防性的治療，應在花粉季節開始前二至四個禮拜期間使用。
3. 若有鼻黏膜局部感染、最近有鼻腔手術或鼻腔外傷者，本藥可能會惡化感染情況及影響傷口癒合，應先告知醫師。
4. 本藥可能會抑制免疫系統功能，使您更容易受到感染。請避免接觸水痘或麻疹患者。
5. 如果症狀沒有改善或症狀惡化，請立即就醫。
6. 懷孕或準備懷孕、哺乳、肝疾病、任何類型的感染（包括感冒或流感，結核，眼皰疹感染）、青光眼或白內障病史，請告知醫師。

### ◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
  - 過敏反應：蕁麻疹；嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹；胸悶、呼吸困難。
  - 感染徵象包括發燒、發冷、重度喉嚨痛、耳朵或鼻竇疼痛、咳嗽、多痰或痰液有顏色變化、排尿疼痛、口瘡或傷口不癒合。
  - 口腔或喉嚨發紅或有白苔。
  - 視力改變、眼睛痛。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
頭痛、鼻腔出血、咽頭炎、鼻腔刺激。