

## Ofloxacin 耳用製劑衛教單張

| 學名        | 商品名                                | 中文名    | 含量/劑型          |
|-----------|------------------------------------|--------|----------------|
| Ofloxacin | Ofloxin <sup>®</sup> otic solution | 耳普欣點耳液 | 3 毫克/毫升；5 毫升/瓶 |

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

成人及小兒外耳炎、成人及青少年鼓膜穿孔之慢性中耳炎、裝有鼓膜造口管的小兒急性中耳炎。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示使用，即使病情好轉，仍應完成整個療程，勿自行停藥。
2. 本品為耳用滴劑，不可用於點眼及眼圈附近的塗敷。

◆ **使用方式：**

1. 使用潤濕的紙巾將耳朵清潔乾淨和擦乾，用肥皂及清水將雙手洗淨。
2. 用手握住耳用滴瓶數分鐘，使溫度接近體溫。
3. 將耳滴劑振搖均勻，打開瓶蓋，使滴管頭朝下。
4. 側躺或傾斜或趴在桌上，將用藥的耳朵朝上，成人耳朵往後上方拉，小孩耳朵往後下方拉，有助於藥液流入耳朵內，依醫師指示用量，滴入耳朵，並避免瓶口碰觸到皮膚。
6. 保持原側躺姿勢 10 分鐘，使藥液停留在耳朵內。
7. 若另一側耳朵也需用藥，重複上述步驟 1-6。
8. 用畢，將瓶蓋關緊，雙手洗淨。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

對本藥或其賦形劑成分過敏者。對其他 quinolone 類抗生素過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快使用；若接近下次用藥時間，按時使用下次劑量即可，不可使用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於室溫 25°C 以下，避光、避熱、避濕。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項**

1. 如果藥水溫度過低，滴入時可能會發生暈眩的現象，可以用手握住耳用滴瓶數分鐘，使藥水溫度接近體溫。
2. 點耳時，應注意避免瓶口接觸耳朵而造成藥水污染。
3. 請勿持續服用超過指示的期間，可能會發生二次感染。
4. 已懷孕或計畫懷孕、哺乳，請先告知醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

過敏反應：蕁麻疹；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，伴隨或未伴隨發燒；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

耳痛、耳朵癢、外耳道發紅、不明分泌物、頭痛、暈眩。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/04/17 修訂】

BTC00EO05-02