

Ambroxol 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ambroxol	Musco®	美舒咳錠	30 毫克/錠

◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

1. 為祛痰劑：具有黏液排除促進作用與溶解分泌物的特性，可促進呼吸道內黏稠分泌物的排除及減少黏液的滯留，而使呼吸順暢。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
2. 樂咳痰舒長效錠(Loxol SR)為長效錠，服用時以充分開水整粒吞服，請勿剝半、嚼碎或磨粉。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其所含賦形劑過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 使用祛痰劑 ambroxol 與嚴重皮膚損害有時間關聯性，通常與潛在疾病及/或併用藥物有關。在嚴重皮膚不良反應的早期階段，可能先出現類似流感的非專一性前兆症狀（如：發燒、身體感覺疼痛、鼻炎、咳嗽及喉嚨痛）。若受這些類似流感之非專一性前兆症狀的誤導，一開始可能會使用咳嗽及感冒藥來作症狀治療。因此，如果皮膚或黏膜出現新的傷口，須立刻尋求醫療諮詢並停藥。
2. 若已懷孕(懷孕前三個月不建議使用本藥品)、計畫懷孕、要哺乳的婦女，或有其他病史，請告知您的醫師。
3. 請告知您的醫師和您現在服用的所有藥品，包含處方藥、非處方藥、維他命、中草藥。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

過敏性反應(包括：過敏性休克、血管性水腫、瘙癢症皮疹、蕁麻疹)、嚴重皮膚不良反應(包括：多形性紅斑、史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症、急性廣泛性發疹性膿皰症)。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

疲倦、口渴、流鼻水、便秘、排尿困難、接觸性皮膚炎、胃灼熱、消化不良。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2025/4/17 修訂】

BTC00EQ02-02