

Cinchocaine/Policresulen 外用栓劑衛教單張

商品名	中文名
Posuline® supp.	宜痔平栓劑

◆ **組成：**

每顆含局部麻醉劑 Cinchocaine HCl 2.5 mg 及止血殺菌劑 Policresulen 100 mg。

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
痔瘡及肛門直腸裂隙和破裂所引起之疼痛、出血、搔癢及發炎。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本品任一成分過敏者。
2. 孕婦及哺乳婦需經醫師評估後使用。

◆ **使用方式：**

1. 雙手洗淨擦乾。
2. 由指示處撕開栓劑外包裝，取出藥物。
3. 側躺，將上側膝蓋提起靠近胸部。上臀抬高露出肛門。
4. 栓劑較尖的一端朝前，用食指輕按栓劑之底部，再塞入肛門 2-3 公分處，越過肛門括約肌。用手捏住兩側臀肌，避免栓劑脫出。
5. 將手徹底洗乾淨。

◆ **注意事項：**

1. 栓劑變形時，照原塑膠包裝形態，浸於溫水(40~50℃)中，軟化後再浸於冷水(20℃以下)即可凝固。
2. 栓劑如軟化或溶化時，可浸於冷水(20℃以下)即可凝固。
3. 栓劑可能會變色，但若在保存期限內且保存情況良好，變色不會影響藥品的藥效。

◆ **藥品儲存：**

1. 應儲存於 25℃ 以下，陽光無法直射處。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 在開始治療時偶有輕微的局部不適，如：癢、燒灼感。但通常能迅速消退，不需停藥。
2. 如有過敏反應、蕁麻疹發生，請立即就醫。