

### Permethrin 外用乳膏衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Permethrin	Permethrin 5% w/w cream	滅疥乳膏	3000mg/60 gm/tube

◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

治療疥瘡。

◆ **用量與用法：**

1. 成人和兒童 - 將本品塗抹全身。應在 8 至 14 小時後再洗去乳膏（淋浴或沐浴）。原則上單次治療即可。病人在治療後可能會出現持續性瘙癢。這很少是治療失敗的跡象，也不是再治療的表徵。14 天後觀察到疥蟲表示需要重新治療。
2. 疥瘡很少感染成人的頭皮，但嬰兒和老年病人的髮際、頸部、太陽穴和前額可能會感染。一般成年人約使用 30 克(半條)劑量。嬰兒應在頭皮、太陽穴和前額上進行治療。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

已知對滅疥乳膏成分有過敏反應或對除蟲菊精類、類除蟲菊素之任一成分會發生過敏者。

◆ **忘記用藥時該如何處理？**

想起時儘快塗藥，若已接近下一次用藥時間則略過一次，依照原定時間用藥，絕不可一次使用雙倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 30°C 以下室溫保存。
2. 請將藥品放置於孩童接觸不到的地方，避免孩童誤食或碰觸。

◆ **注意事項：**

1. 擦藥期間除了衣物以外，盡量避免碰觸其他物體，也禁止洗手，避免藥物被洗掉，戴手套是比較好的保護方式。
2. 若是小孩、老人或是免疫力不全的病人，可能會需要塗抹頸部以上的部位，但請務必避開眼睛和嘴巴周圍。

◆ **可能引起的副作用和發生時的處理方法：**

使用後副作用罕見，主要副作用為皮膚症狀，少數接觸性皮膚炎。

1. 如發生以下症狀時，請暫停使用並立即就醫

有 1-10% 病人接受治療後，可能出現全身或局部皮疹、紅斑等過敏反應。