

兒童牙科診療注意事項-牙髓治療

- 因治療需要而施行牙科麻醉，也就是所謂的打針、打麻藥，治療範圍內的牙齒及口腔黏膜、臉頰、嘴唇將暫時麻痺沒有感覺，這樣的情況將持續一至三小時甚至更久，在麻醉期間請勿咀嚼食物避免嘴唇或口腔粘膜咬傷。喝水、喝飲料則不受限制。初次上麻藥的小朋友未曾體驗過這種局部腫麻的感覺，或許會告訴家長覺得是痛，請家長放心。另請家長務必注意幼童不要吸、咬嘴唇或用手一直搓揉麻醉部位，避免造成嘴唇腫傷或臉頰抓傷。
- 治療包含乳牙斷髓治療，這是一種蛀牙尚未影響所有齒內神經前，將牙冠神經截斷清除的術式。有極少數的小朋友接受斷髓治療後，有疼痛或牙齦腫脹的情形，此時需回診繼續接受根管治療。
- 治療包含乳牙根管治療，這是一種蛀牙已經影響到齒內神經甚至擴散到牙根周圍組織時，將所有牙冠及牙根神經清除的術式。少數小朋友術後有疼痛或牙齦腫脹的情形，請按時服藥，減輕疼痛。若沒有疼痛的情形便不必服藥。

恩主公醫院牙醫部 感謝您的配合與注意

若有任何疑問請

(02)2672-3456 分機3101/3102 謝謝