

兒童牙科診療注意事項-拔牙

- 因治療需要而施行牙科麻醉，也就是所謂的打針、打麻藥，治療範圍內的牙齒及口腔黏膜、臉頰、嘴唇將暫時麻痺沒有感覺，這樣的情況將持續一至三小時甚至更久，在麻醉期間請勿咀嚼食物避免嘴唇或口腔粘膜咬傷。喝水、喝飲料則不受限制。初次上麻藥的小朋友未曾體驗過這種局部腫麻的感覺，或許會告訴家長覺得是痛，請家長放心。另請家長務必注意幼童不要吸、咬嘴唇或用手一直搓揉麻醉部位，避免造成嘴唇腫傷或臉頰抓傷。
- 小朋友接受拔牙治療，請家長提醒小朋友要緊咬紗布半小時、不要講話、口水要吞到肚子裡，不要含在嘴裡或吐口水，嘴唇也應緊閉以免流口水。若無血液疾病或其他凝血機制相關疾病，且依照以上醫囑，拔牙傷口一定能止血癒合。若非正常換牙而是因嚴重蛀牙需拔除乳牙時，可能需裝戴空間維持器以維持日後恆牙萌發空間。

恩主公醫院牙醫部感謝您的配合與注意！！

若有任何疑問請電 02-26723456 分機3101/3102，謝謝！！