

恩主公醫院牙科糖尿病注意事項

以下是糖尿病患者在接受牙科治療時的安全建議與注意事項：

建議治療時機：血糖控制穩定時

建議在血糖穩定（如空腹血糖約 80 - 130 mg/dL，HbA1c < 7%）時進行牙科治療，以降低術中感染、術後癒合不良等風險。

安全藥物與麻醉

局部麻醉（如利多卡因 Lidocaine）通常對糖尿病患者安全。

常見安全藥物包括：

抗生素 Antibiotics：青黴素（Penicillin）、阿莫西林（Amoxicillin）、頭孢氨苄（Cephalexin）。

止痛藥 Painkillers：普拿疼（Acetaminophen）為首選。

慎用藥物：

類固醇（Steroids）：可能升高血糖。

某些消炎止痛藥（NSAIDs）：如布洛芬（Ibuprofen），應依醫師建議使用。

診療注意事項

避免空腹看診，以免治療期間出現低血糖（Hypoglycemia）。

建議進食後 1 小時內就診最為穩定。

看診時請攜帶血糖紀錄與降血糖藥物資訊。

隨身攜帶含糖食物（如糖果、葡萄糖錠）以備不時之需。

治療優先順序與口腔保健

糖尿病與牙周病密切相關，易有牙齦發炎、出血、牙齒動搖等問題。

急性症狀（如膿腫、牙齦腫痛、牙齒劇痛）應立即治療，避免感染擴散。

恩主公醫院牙科關心您！

牙科部電話：(02)2672-3456 轉 3101 / 3102

為了您的口腔健康，敬請合作！謝謝！