

恩主公醫院牙科慢性腎臟病注意事項

慢性腎臟病患者因代謝能力下降、凝血功能異常及藥物代謝改變，接受牙科治療時須特別留意。以下為腎病患者的安全建議與注意事項：

建議治療時機：依透析與病情安排

建議在透析前一天或非透析日進行牙科治療，以避免出血風險或因肝素影響凝血。治療前應掌握腎功能（如 eGFR）、凝血指數（如 INR）、是否接受抗凝血治療等資訊。

安全藥物與麻醉

腎功能不佳會影響藥物代謝與排泄，需選代謝途徑不依賴腎臟的藥物。

常見相對安全藥物包括：

抗生素 Antibiotics：阿莫西林 (Amoxicillin)、克林黴素 (Clindamycin)

止痛藥 Painkillers：撲熱息痛 (Paracetamol / 普拿疼) 為首選

禁用或慎用藥物：

氨基糖苷類 (如慶大黴素 Gentamicin)：具腎毒性

NSAIDs (如布洛芬 Ibuprofen)：可能加重腎損傷

四環黴素 (Tetracycline)：影響腎臟排毒，應避免使用

診療注意事項

慢性腎病患者易有出血傾向與免疫功能低下，須特別注意：

術前確認凝血功能，若使用抗凝藥須與腎臟科醫師評估是否暫停。

治療優先順序與口腔保健

腎病患者常有口腔乾燥、口臭、牙齦發炎或骨質疏鬆等問題。

急性疼痛、感染、膿瘍等應優先處理。延遲治療可能造成菌血症、心內膜炎等併發症。

恩主公醫院牙科關心您！

牙科部電話：(02)2672-3456 轉 3101 / 3102

為了您的口腔健康，敬請合作！謝謝！