

恩主公醫院牙科自閉症注意事項

自閉症光譜障礙患者在感官、溝通與行為反應上具有獨特特質，牙科治療需因應個別差異、提供友善且漸進式的醫療環境。以下為相關建議與注意事項：

建議治療時機：熟悉環境並事先規劃

初診可安排短時間、無侵入性接觸（如認識診間、醫師、器械聲音）以降低焦慮。

建議選擇病人情緒穩定時段看診（如早上），並事先告知家長預估流程與治療時間。

麻醉與用藥安全

局部麻醉（如利多卡因 Lidocaine）通常安全可用。

對於配合困難或極度敏感者，可考慮鎮靜（如口服鎮靜或笑氣）或全身麻醉，由麻醉科醫師評估決定。

丙戊酸（Valproic Acid）可能增加出血風險，若需拔牙或手術處置，應與主治醫師討論是否需調整劑量。

卡馬西平（Carbamazepine）可能與某些抗生素（如大環內酯類 Macrolides）或止痛藥產生代謝交互作用，**應避免與紅黴素（Erythromycin）合用**，以免影響藥物代謝，增加毒性風險。

診療注意事項

看診時應減少刺激（如關閉強光、降低器械音量），避免不必要的觸覺刺激。縮短每次治療時間，治療中可安排休息或中止機制。

治療優先順序與口腔保健

優先處理疼痛、蛀牙、牙齦發炎等影響進食與生活的急性問題。

使用電動牙刷、定時器、圖像引導等輔助工具，增加清潔效率與接受度。

恩主公醫院牙科關心您！

牙科部電話：(02)2672-3456 轉 3101 / 3102

為了您的口腔健康，敬請合作！謝謝！