

Oxybutynin 外用貼片衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Oxybutynin	Oablok® Ex PATCH	歐保尿克快適貼布	73.5 毫克/貼片

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療膀胱過動症。

- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 尿液滯留。
2. 狹角型青光眼。
3. 嚴重心臟疾病。
4. 胃出口、十二指腸、或小腸阻塞，麻痺性腸阻塞及其他嚴重胃腸蠕動降低狀況。
5. 胃弛緩或腸弛緩。
6. 重症肌無力。
7. 曾有對本品藥物成分過敏。
8. 正在哺乳。

- ◆ **用量與用法：**

每次 1 片，每 24 小時更換 1 次。應考量沐浴等活動，謹慎思考開始使用時間。

黏貼部位：

- ✓ 一般貼在下腹部、腰部或大腿，清潔、乾燥、無毛髮、完整健康的皮膚上。
- ✓ 每日輪流貼於不同部位，勿重複於使用於相同部位，以避免刺激皮膚。
- ✗ 貼布和衣服摩擦可能會脫落，應避免貼在腰帶碰到的地方。
- ✗ 不可貼於有傷口或出現濕疹或皮膚炎的部位。

使用步驟：

- ↓(第一次使用請略過此步驟)先撕下前一天貼的貼片，撕下時動作應緩慢避免傷害皮膚。
貼片黏性面朝內對折並壓緊，用過的貼片因仍有殘餘藥物，應安全地丟棄到小孩拿不到的地方。
- ↓清潔使用部位並充分乾燥。
- ↓打開鋁箔袋取出貼片，貼片取出後封上鋁箔袋封口。
- ↓貼片從膠膜中央反摺，撕開一邊的膠膜，露出黏著面。
- ↓將黏著面抵在黏貼部位，邊撕另一邊膠膜邊貼。
- ↓用手掌按緊貼片，確保各邊緊密黏附。
- ↓以肥皂及清水將手洗淨。

- ◆ **藥品儲存：**

1. 儲放在 25°C 以下，存放在陰涼而乾爽的地方。
2. 鋁箔袋開封後請封上封口後保存。
3. 貼片請保存於鋁箔袋中，使用前才取出貼片，取出後立即封上封口。
4. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/7/24 修訂】

BTC00EE08-02

Oxybutynin 外用貼片衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Oxybutynin	Oablok® Ex PATCH	歐保尿克快適貼布	73.5 毫克/貼片

◆ 注意事項：

1. 撕下貼片時應緩慢且輕柔，避免傷害皮膚。
2. 用藥後可能會有視力模糊、頭暈、嗜睡等情形，盡量避免開車、騎車或操作危險性機械，除非您已確認藥品對您無影響。
3. 過量使用，會有尿液滯留、瞳孔放大、興奮、心搏過速的症狀，應立即取下貼布，並依症狀給予適當治療。
4. 洗澡、游泳或淋浴不會影響貼片，避免將貼片長時間曝露在外部的熱源(過度日曬、三溫暖、日光浴、長時間接觸電熱毯)。
5. 懷孕、計畫懷孕或哺乳，請先告知醫師。

◆ 可能引起的副作用和發生時的處理方法：

最常見的副作用為用藥部位紅疹、搔癢、濕疹、汗皰疹，大部分為輕至中度，若症狀嚴重且持續請立即就醫。

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
嚴重過敏。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
用藥部位皮膚炎、口乾、便秘、嗜睡、排尿困難、尿液滯留。