

Filgrastim 注射劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Filgrastim	Nivestim®	奈維血添注射/輸注液	300 微克/0.5 毫升/針

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

- 1 動員造血幹細胞至周邊血中。
- 2 促進造血幹細胞移植時嗜中性白血球數的增加。
- 3 癌症化學療法所引起之嗜中性白血球減少症。
- 4 先天性、特異性嗜中性白血球缺乏症。

◆ **用量與用法：**

請依照醫師指示使用，通常為每天一次至兩次，注射於皮下。

注射部位：大腿或腹部(避開肚臍周圍)。每次請輪流注射於不同位置。

使用步驟：

- ↓ 回復室溫，先將藥品置於室溫下 15 – 30 分鐘。
 - ↓ 先用肥皂及清水洗淨雙手，將注射器從包裝袋中取出，確認包裝是否完整、注射液是否澄清無漂浮物，若出現變色或漂浮物請勿使用。
 - ↓ 選擇適當的注射部位，並於注射前先用酒精棉片消毒注射部位周圍。
 - ↓ 用兩指捏起大塊皮膚，將注射針頭以約 45 度角插入。將活塞稍微往後拉，確認沒有血液出現。慢慢推進活塞，直到藥物完全打入皮下組織。
- 若出現血液，請將針頭拔出並重新選擇注射部位。**
- ↓ 小心將注射器自皮膚移除後鬆開活塞，針頭保護蓋會自動彈上並鎖住。
 - ↓ 將使用過的注射器置於密閉容器中，交給醫護人員回收，切勿當作一般垃圾丟棄。



◆ **不宜使用此藥的情形 (使用禁忌)：**

- 1 對本藥或其賦形劑成分過敏者。
- 2 骨髓中芽球未有效減少，或由周邊血液中可以觀察到骨髓芽球[骨髓芽球可能增加]之骨髓性白血病的病人。

◆ **藥品儲存：**

- 1 請將藥品置於冰箱冷藏 (2 – 8°C) 保存，絕對不可將此藥品存放在冷凍庫。
- 2 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人使用。
- 3 基於隨身使用目的，在有效期限內可將本品自冷藏設備中取出並存放於室溫 (不超過 25°C)，但僅限取出一次且最長為 15 天。到第 15 天時，不得將藥品放回冷藏設備，而應丟棄。

◆ **注意事項：**

- 1 若藥品儲存時未放置於冰箱，不要丟棄，將藥品冰回冰箱中並與我們聯繫。
- 2 若藥品包裝疑似破損或注射液不是澄清、無色、無漂浮物，請勿使用並與我們聯繫。
- 3 應輪流注射不同部位，並避開肚臍周圍 1 公分範圍。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/04/30 修訂】

BTC00EL13-02

Filgrastim 注射劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Filgrastim	Nivestim®	奈維血添注射/輸注液	300 微克/0.5 毫升/針

- 4 此藥有引起過敏的可能性，發生時就需要立即停止用藥。
- 5 注射此藥時，須定期進行血液檢查，以監測嗜中性白血球數量。
- 6 此藥的投與有引起骨痛、腰痛等的可能性，若症狀嚴重且持續時請告知醫師。

◆ **本藥可能引起的哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 嚴重過敏反應：蕁麻疹、皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- 肺部問題：發燒、咳嗽、呼吸困難。
- 脾臟問題：左上腹和/或肩膀尖端疼痛。
- 微血管問題：排尿量改變；無法排尿；血尿；心跳過速或異常；胸痛或胸悶；頭昏或暈厥；呼吸短促；體重大幅增加；腫脹；嘔血或嘔吐咖啡渣樣物或黑便、柏油便或血便。
- 骨痛、腰痛、關節痛等任何不會消失的疼痛。

2 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭暈、頭痛、關節痛、肌痛、疲倦、噁心、嘔吐。