


Imiquimod 外用乳膏衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Imiquimod	Aldara® Cream 5%	樂得美乳膏	5%, 250 毫克/包

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療成人生殖器外部的疣，肛門周圍的疣和濕性尖疣。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 已知對 imiquimod 或配方中的賦形劑過敏者。
 2. 皮膚有潰瘍或未癒合之瘡患。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 一般的使用次數為每週三天，每天於臨睡前使用一次，每逢星期一、三、五或二、四、六或遵照醫生的指示使用。
 2. 應持續使用乳膏，直至疣患完全消失為止，但不應連續使用超過 16 週。疣患一般在用後 8~10 星期消失，也可能早至 4 星期便痊癒。如疣患復發，請告知醫生。
 3. 使用步驟：

	<p>臨睡前，請將雙手洗淨，然後拆開包裝袋，將「樂得美」擠於手指頭上。</p>
	<p>將乳膏薄塗於潔淨而乾爽的疣患表面，輕輕按摩，直至乳膏完全滲透。</p>
	<p>完成後，請把剩餘的乳膏連包裝袋一併丟棄，勿讓兒童接觸。請以性質溫和的肥皂和水清洗雙手。</p>
	<p>在塗抹乳膏後 6~10 小時內，請勿洗澡。</p>


該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/7/24 修訂】

BTC00EW25-02

Imiquimod 外用乳膏衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Imiquimod	Aldara® Cream 5%	樂得美乳膏	5%, 250 毫克/包



◆ 藥品儲存：

1. 儲放在 25°C 以下，存放在陰涼而乾爽的地方，但切勿冷凍。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ 注意事項：

1. 應避免性接觸（性交、肛交或口交）。如有需要，請在性接觸後才塗抹乳膏。若已經塗抹「樂得美」，應在性接觸前把乳膏洗掉。
2. 「樂得美」可能會減低保險套或子宮帽的避孕功效，故若在性交時使用保險套或子宮帽，應在進行前把乳膏洗掉。
3. 塗抹乳膏後，請勿以繃帶或其他敷料覆蓋疣患。
4. 請依照建議份量將乳膏薄塗於疣患表面，切勿過量使用。
5. 懷孕或以母乳餵哺嬰兒期間，應停止使用「樂得美」。
6. 醫生是因應您的個人情況而處方藥膏。即使您認為自己的情況與他人相若，亦不應將乳膏轉贈他人。
7. 忘記使用「樂得美」，應在發現後立即將適量的乳膏塗於患處，並繼續原定之療程。
8. 用藥過量，使用過多「樂得美」乳膏，會引致皮膚出現嚴重的反應。因此，應以性質溫和的肥皂和清水洗去多餘的乳膏。
9. 誤吞乳膏會引致噁心、嘔吐、頭痛、肌肉疼痛和發熱。若誤吞乳膏，請立即到就近的急診室求醫或通知醫生。

◆ 可能引起的副作用和發生時的處理方法：

1. 通常會有局部皮膚反應如發癢、灼熱、疼痛、紅斑、糜爛、剝皮/片脫落及浮腫等，大部份的皮膚反應均屬溫和至中等，在停藥 2 週後即可恢復正常。若皮膚反應嚴重，須以中性肥皂和清水洗掉藥品，待情況消退後可以再重新使用。
2. 其他可能會發生的副作用有疲累、發燒、類似感冒症狀、頭痛、腹瀉、肌肉痛等，若狀況持續且嚴重，請於回診時告知醫師。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/7/24 修訂】

BTC00EW25-02