

Teriparatide 注射劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Teriparatide	Alvosteo®	艾歐骨得注射液	20 微克/劑量；0.6 毫克/2.4 毫升/筆

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 停經後婦女骨質疏鬆症具高度骨折風險者。
2. 男性原發性或次發於性腺功能低下症之骨質疏鬆症且高度骨折風險者。
3. 女性及男性因糖化皮質類固醇治療引起之骨質疏鬆症且具高度骨折風險者。

◆ **用量與用法：**

請依照醫師指示使用，每天一次注射於皮下。

注射部位：大腿或腹部(避開肚臍周圍)。

使用步驟：

↓ 每次注射之前用肥皂將雙手徹底洗乾淨後擦乾。

↓ 打開筆蓋，將卡式管架旋轉取下。將卡式管推回後，重新旋回卡式管架。



↓ 以酒精棉消毒注射筆橡皮塞處，將針頭垂直緊密旋入卡式管架上。



↓ 第一次使用時，需進行注射準備。旋轉至看到水滴符號，按下注射鈕排出針頭尖端的滴劑。(注意：僅第一次使用時需進行此排空步驟)



↓ 日常使用時，旋轉劑量按鈕直到無法旋轉，確定視窗出現箭頭符號。

↓ 於**大腿或腹部**，以兩手指輕輕捏起一小塊皮膚，將針頭垂直插入皮膚中，**按壓注射鈕到底**，

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/04/30 修訂】

BTC00EZ13-02


Teriparatide 注射劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Teriparatide	Alvosteo®	艾歐骨得注射液	20 微克/劑量；0.6 毫克/2.4 毫升/筆

緩慢地從 1 數到 6，然後將針頭緩慢拔出皮膚。


使用艾歐骨得注射筆注射

1. 安裝注射筆針頭




安裝針頭。

2. 劑量設定




旋轉劑量旋鈕直至無法進一步旋轉。確保顯示視窗出現**箭頭**符號。

選定注射部位



請輕以拇指和食指捏起大腿或腹部皮膚褶皺。將針頭垂直溫和地插入皮膚中。



按下按鈕到底，停留在皮膚至少**六秒鐘**。

*** 注意：如果卡式管含量少於80微升，劑量旋鈕則無法旋轉到箭頭處。此時請取下針頭，更換卡式管，再進行注射準備。**

- ↓ 針頭自皮膚抽出後，檢查確定劑量顯示視窗已回到起始位置，表示已正確完成注射。
- ↓ 將針頭外蓋蓋上後取下針頭，丟棄於不易被穿刺的容器內。
- ↓ 蓋上卡式管架後，**立即將注射筆放回冰箱冷藏。**



將注射筆緩慢拔出皮膚。查看劑量在顯示視窗是否回已到起始位置，以確認完成注射。



小心將針頭外蓋蓋上針頭。



取下針頭，丟棄於防刺銳器處置容器。

*** 在用完28天藥劑前，請勿將卡式管從注射筆中取出。**



使用完畢後盡速將整支注射筆放回**2到8°C**的冷藏冰箱。

◆ 不宜使用此藥的情形（使用禁忌）：

對本藥或其賦形劑成分過敏者。

◆ 藥品儲存：

- 1 每次注射完請蓋回筆蓋後置冰箱冷藏（2–8°C）保存，絕對不可將注射筆存放在冷凍庫。若要出門請務必將藥品放置於藥品專用保冷袋中。
- 2 第一次使用後 28 天，請丟棄注射筆，即使筆內仍有藥劑。
- 3 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用或與他人共用注射筆。

◆ 注意事項：

- 1 若藥劑已凍結，請丟棄此注射筆，並使用新的注射筆。
- 2 若注射筆未放回冰箱，不要丟棄此注射筆，將注射筆冰回冰箱中並與我們聯繫。
- 3 若注射筆疑似破損或藥劑不是澄清、無色、無顆粒，請勿使用並與我們聯繫。
- 4 針頭僅能使用一次，每次注射時都應裝新的針頭。用過的針頭存放在不易被穿刺的容器，並用蓋子栓緊，帶回醫院回收。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/04/30 修訂】

BTC00EZ13-02

Teriparatide 注射劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Teriparatide	Alvosteo®	艾歐骨得注射液	20 微克/劑量；0.6 毫克/2.4 毫升/筆

- 5 用水沾濕布擦拭注射筆即可，勿使用酒精及任何其他清潔劑。
- 6 艾歐骨得注射筆使用壽命為兩年，丟棄前請取下針頭及用過的卡式管，並依照醫護人員指示丟棄。
- 7 初期給藥可能會發生姿勢性低血壓，出現頭暈或心悸現象，可坐下或躺下直到症狀消失。起身時動作應放慢，避免跌倒。
- 8 除使用藥物外，應配合生活習慣調整（避免煙酒等）、飲食計畫（補充鈣或維他命 D）及運動計畫（負重運動）來延緩骨質流失。
- 9 若持續出現高血鈣症狀（例如：噁心、嘔吐、胃部不適、便秘、倦怠、肌肉無力、骨骼疼痛），請立即回診。
- 10 有骨骼柏哲德氏症、骨質疏鬆症以外的骨骼問題，骨骼沒有停止生長的孩童或青少年，有骨癌或骨骼的放射治療病史，請先告知醫師。
- 11 有使用任何藥物（尤其是毛地黃）、懷孕或準備懷孕、哺乳、高血鈣或副甲狀腺機能亢進病史，請先告知醫師。

◆ 本藥可能引起的哪些副作用？當發生時該如何處理？

- 1 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 嚴重過敏：蕁麻疹、皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
 - 急性呼吸困難，胸痛。
 - 高血鈣：虛弱、意識惑亂、疲倦、頭痛、胃部不適和嘔吐、便秘或骨骼疼痛
 - 腎結石：背痛、腹痛或尿血
 - 骨痛、任何不會消失的疼痛、輕微腫塊或皮下腫脹。
- 2 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

注射後出現頭暈或心悸現象：可坐下或躺下直到症狀消失。

頭暈、疲倦、虛弱、腹瀉或便秘、腿抽筋、關節痛或肌肉痙攣、流鼻涕、咳嗽。