


嬰兒餵藥的方法

一、 寶寶在家服用藥物應注意下列事項：

- 1.家屬應依醫囑按時給藥，非經醫師指示，不可自行增減藥量。
- 2.藥物應在餐前或餐後給予，不可加在牛奶內，以免影響給藥量及藥物吸收。
- 3.可利用空針、滴管、杯餵、小湯匙等，給予寶寶餵藥，勿以奶瓶餵食，以免嬰兒拒絕進食。
- 4.餵藥時將寶寶抱起，托起頭部成半臥位，將藥水輕輕置於舌頭兩旁，並將藥物慢慢滴入，讓寶寶有時間吞嚥，且每次餵食量最多不超過 1mL。
- 5.餵藥時寶寶若出現嗆咳，要立即停服，並抱起輕拍背部。



二、 低體重兒居家常使用的藥物及注意事項：

- 1.鐵劑（富鐵好滴劑 Ferrum）：主要是治療低體重兒貧血，所含的鐵是以氫氧化三鐵之複合物，可在餐中服用，不會影響其療效，服用鐵劑時，寶寶的大便有時會呈黑色、深綠色，或出現便秘是屬於正常的現象。

2.多種維他命：少數寶寶服用時會有腹瀉現象，可先暫停服用，並預約門診與醫師討論。

參考資料：

張錄怡、蔡綠蓉（2021）．住院兒童之反應及其護理．於陳月枝總校閱，*實用兒科護理學*（九版，57-59頁），台北市：華杏。

蔣立琦（2021）．住院兒童之反應與護理．於黃美智、蔣立琦總校閱，*兒科護理學*（六版，4-57 - 4-58頁）．永大。

諮詢電話02-26723456轉6918.6919

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院