

舌下含片服用須知

一、舌下含片：**Nitrostat 0.6mg**

二、藥物用途：緩解因冠狀動脈狹窄所引起之急性心絞痛。

三、服用須知：

- 1.胸悶或胸痛不適時，立即含一粒於舌下，切忌吞服或咬碎，經快速溶解後迅速吸收，服用時有辛辣感是正常現象。
- 2.服用時須坐下或躺下，以免因血壓突然下降頭暈而跌倒，且藥勿與治療性功能障礙藥物(如：Sildenafil、Vardenafil、Tadalafil)及其他血管擴張劑同時服用。
- 3.服用後約 1-3 分鐘可發生作用，並在 5 分鐘時達到最大作用。
- 4.含一粒無效時，間隔五分鐘可再含第二粒，若在 15 分鐘內服用三粒後依舊疼痛無效，須立即就醫，切忌延誤。
- 5.舌下錠保存方式：本藥容易揮發而失去藥效，須置於原包裝不透光玻璃瓶中原包裝瓶內室溫儲存並避免潮濕、高溫處(如：口袋內)。保存期限依瓶身日期，開瓶後僅維持 3-6 個月之有效，舌下含服時若無出現麻刺感，代表藥物可能失去效果，應再次就醫重新開立。



圖一 Nitrostat 藥瓶圖

參考資料：

- 1.衛生福利部食品藥物管理署（2021，2月5日）。藥物食品安全週報。
<https://www.fda.gov.tw/tc/PublishOtherEpaperContent.aspx?id=1338&tid=&r=2021910386>
- 2.衛生福利部食品藥物管理署（2025，8月1日）。藥品仿單查詢平台。
https://mcp.fda.gov.tw/im_detail_pdf/%E8%A1%9B%E7%BD%B2%E8%97%A5%E8%BC%B8%E5%AD%97%E7%AC%AC020802%E8%99%9F

諮詢電話02-26723456轉6105

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院