

Lidocaine HCl 外用凝膠衛教單張

學名	商品名	中文名	規格/劑型
Lidocaine HCl	Xylocaine Jelly®	苦息樂卡因凝膠	2%, 30 克/條

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您病情與下述不同，請與我們聯絡)
表面麻醉。苦息樂卡因凝膠在黏膜表面產生快速且顯著之麻醉效果，並有潤滑作用減少摩擦。

◆ 使用方式：

適量塗抹在目標部位。麻醉效果通常快速產生(5 分鐘之內，視用藥部位而定)，麻醉效果約 20-30 分鐘。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對醃胺類局部麻醉劑、對甲基及丙基對羥基苯甲酸酯 (methyl-/propyl paraben)，或對其代謝物對胺基苯甲酸 (PABA) 過敏者或凝膠中其他成分有過敏病史者。

◆ 藥品儲存：

1. 室溫 25°C 以下，不可冷凍。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人使用。

◆ 注意事項：

1. Lidocaine 產品的劑量過高或給藥間隔太短，可能會造成藥物的血漿濃度過高及嚴重的不良反應。
2. 在口咽部使用局部麻醉劑，可能會妨礙吞嚥，因而增加吸入之危險性。舌頭或口腔黏膜麻木，可能增加咬傷之危險性。
3. 如有使用第三類抗心律不整藥物 (如：amiodarone，本院的臟得樂錠)，需告知醫師。並須監測其心電圖 (ECG)，因為對心臟方面可能會有影響。
4. 心臟傳導部分或完全阻斷之病人、老年人及健康狀況差之病人、有晚期肝病或重度腎功能障礙的病人在使用苦息樂卡凝膠須特別注意。
5. 有紫質沉著性、急性紫質症之病患須諮詢醫師才可使用。

◆ 本藥可能引起哪些副作用?當發生時該如何處理?

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*若塗抹處出現異常劇烈發癢、冒水泡、或紅腫範圍擴大，請立即停止用藥並用清水洗淨，並盡快就醫檢查。

*因塗抹範圍過大、時間過久或吸收過快，導致血液中藥物濃度過高：感到莫名頭暈、神智不

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/7 修訂】

BTC00E503-02

Lidocaine HCl 外用凝膠衛教單張

學名	商品名	中文名	規格/劑型
Lidocaine HCl	Xylocaine Jelly [®]	苦息樂卡因凝膠	2%, 30 克/條

清、耳朵嗡嗡響(耳鳴)、視力模糊，或嘴唇舌頭發麻。出現肌肉抽筋、呼吸困難或心跳異常。



藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/7 修訂】

BTC00E503-02