

Lidocaine 外用噴霧衛教單張

學名	商品名	中文名	規格/劑型
Lidocaine	Xylocaine Spray 10% [®]	苦息樂卡因唧筒式噴霧劑	10 毫克/劑, 80 公克/瓶

- ◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您病情與下述不同，請與我們聯絡)
局部麻醉。
- ◆ 使用方式：
 1. 苦息樂卡因唧筒式噴霧劑用於黏膜之上，大約可持續 **10-15 分鐘** 之表面麻醉作用。麻醉作用約在 **1-5 分鐘之間發生**，視使用面積而定。
 2. 噴嘴已彎曲成形，使用前無須變動。不能將噴嘴弄短，否則噴霧的功能會被破壞。噴嘴不可重複使用，使用後應立即丟棄。
- ◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：
 1. 對醃胺類局部麻醉或噴霧溶液之其他成份有過敏病史。
- ◆ 藥品儲存：
 1. 室溫 **25°C** 以下，在儲存於 **8°C** 以下時可能會發生沉澱。但這種沉澱可在室溫下回溫時溶解。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人使用。
- ◆ 注意事項：
 1. 過高的劑量或投藥的間隔太短，可能會引起高血漿濃度及嚴重不良作用。
 2. **Lidocaine** 噴霧劑用於有傷口或欲使用區域黏膜有傷口的病人應小心；受傷的黏膜會使全身的吸收增加。
 3. 在口咽部使用局部麻醉劑，可能會妨礙吞嚥，因而增加吸入之危險性。舌頭或口腔黏膜麻木，可能增加咬傷之危險性。
 4. 心臟傳導部分或完全阻斷之病人、老年人及健康狀況差之病人、有晚期肝病或重度腎功能障礙的病人使用須特別注意使用。
 5. 有使用第三類抗心律不整藥物(如：**amiodarone**，本院的臟得樂錠)，需告知醫師。並須監測其心電圖 (**ECG**)，因為對心臟方面可能會有影響。
 6. 避免接觸到眼睛。
 7. 有紫質沉著性、急性紫質症(**acute porphyria**)之病患須諮詢醫師才可使用。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/7 修訂】

BTC00E504-02

Lidocaine 外用噴霧衛教單張

學名	商品名	中文名	規格/劑型
Lidocaine	Xylocaine Spray 10% [®]	苦息樂卡因唧筒式噴霧劑	10 毫克/劑, 80 公克/瓶

◆ 可能發生的副作用：

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏反應：若塗抹處出現異常劇烈發癢、冒水泡、或紅腫範圍擴大。

*因塗抹範圍過大、時間過久或吸收過快，導致血液中藥物濃度過高：感到莫名頭暈、神智不清、耳朵嗡嗡響(耳鳴)、視力模糊，或嘴唇舌頭發麻。出現肌肉抽筋、呼吸困難或心跳異常。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*使用部位有局部刺激性、使用在喉部黏膜後，有喉嚨痛、聲音嘶啞及失聲等可逆副作用。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/7 修訂】

BTC00E504-02