

## Nirmatrelvir/Ritonavir 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Nirmatrelvir/Ritonavir	Paxlovid®	倍拉維膜衣錠	N 150 毫克, R 100 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
適用於治療 12 歲以上、具有進展為重症風險因子之輕度至中度新型冠狀病毒疾病。  
\*青少年病人體重須達 40 公斤以上，才核准使用。

◆ **用量與用法：**

1. 成人及 12 歲以上青少年建議劑量：300 mg nirmatrelvir (2 顆 150 mg 錠劑)和 100 mg ritonavir (1 顆 100 mg 錠劑) 一同服用，每日兩次(早晚各 1 次)，持續 5 天。
2. 應在診斷為新冠後以及症狀發作後儘快開始服用倍拉維膜衣錠。**可與食物併服或空腹服用。**
3. 錠劑需整顆吞服，不得咀嚼、分開或壓碎；但**可依 CDC 公告建議方式管灌給藥**



4. 腎功能不全之患者需要調整劑量。(eGFR = 腎絲球過濾率)

腎功能	治療天數	劑量和使用頻次
中度腎功能不全 ( $30 \leq eGFR < 60$ mL/min)	第 1-5 天	150 mg nirmatrelvir (1 顆 150 mg 錠劑)和 100 mg ritonavir (1 顆 100 mg 錠劑)， <b>每日兩次</b> 。
重度腎功能不全 ( $eGFR < 30$ mL/min) 含需要血液透析的患者	第 1 天	300 mg nirmatrelvir (2 顆 150mg 錠劑) 和 100 mg ritonavir (1 顆 100 mg 錠劑)， <b>每日一次</b> 。
	第 2-5 天	150 mg nirmatrelvir (1 顆 150mg 錠劑)和 100 mg ritonavir (1 顆 100 mg 錠劑)， <b>每日一次</b> 。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 已知會對本藥活性成分或對任何賦形劑過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 若您忘記服用，想起時距離您原本應該服藥的時間**未超過 8 小時**，應儘速服用。之後再依原定時間，服用下個劑量。
2. 若想起時距離您原本應該服藥的時間**已超過 8 小時**，就不用服用了。依據原定時間，服用下個劑量，切勿服用雙倍劑量。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/8 修訂】

## Nirmatrelvir/Ritonavir 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Nirmatrelvir/Ritonavir	Paxlovid®	倍拉維膜衣錠	N 150 毫克, R 100 毫克/錠

### ◆ 藥品儲存：

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

### ◆ 注意事項：

1. **本藥品可能與多種藥物產生交互作用**，影響其血中濃度，包括多類心血管用藥、神經系統用藥、抗感染藥及荷爾蒙避孕藥等。治療期間如需使用其他藥物(包含非處方藥、中草藥)，請先諮詢醫師或藥師。
2. 自行停藥可能會導致無徵兆的病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。
3. 服藥後如果症狀沒有改善，甚至惡化，請回診就醫。
4. 如原先就有避孕的需求，服用此藥會降低避孕藥的效果，應暫時改用其他不含荷爾蒙的避孕方式。
5. 在開始使用本藥前，請先告知醫師您是否有藥物過敏史、目前的疾病與用藥情況，以及是否已懷孕、準備懷孕或正在哺餵母乳。

### ◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
  - \*過敏反應: 皮疹或蕁麻疹、吞嚥或呼吸困難、口腔、喉嚨或生殖器出現疼痛性潰瘍或瘡口、嘴唇、口腔、舌頭或臉部腫脹，以及喉嚨緊縮感。
  - \*肝臟問題: 食慾不振、皮膚和眼白泛黃、深色尿液。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
  - \*味覺改變(如金屬味、苦味)、腹瀉、頭痛、腹痛、噁心、嘔吐、肌肉疼痛、高血壓。