

Sulfasalazine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Sulfasalazine	Salazine®	撒樂腸溶錠	500 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
可用於治療潰瘍性結腸炎、類風濕性關節炎。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 撒樂腸溶錠為腸溶錠不建議磨粉或剝半。
3. 服用此藥應**多喝開水並注意防曬**。

*出門要撐傘、擦防曬乳，盡量避開正午陽光。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對有效成份、磺胺類、水楊酸類藥物或本藥任何賦形劑過敏者。
2. 急性間歇性紫質症(AIP): 體內代謝異常，導致神經系統受損的罕見疾病。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時盡快服用;若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 15-30°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 可能會使**尿液呈橘黃色此為正常**現象。
2. 這種藥可能會**在腎臟形成結晶，損傷尿路。建議多喝水**，並回診檢查腎功能。
3. 服藥前及服藥期間得定期量測肝、腎功能、血球數量。
4. 若患有蠶豆症(G6PD 缺乏症)，請務必主動告知醫師。服用此藥期間，若發現尿液顏色變深(像可樂)、皮膚發黃或感到極度疲倦，可能是紅血球受損的跡象，請立即停藥並就醫檢查。
5. 如有在服用其他藥物，像是強心劑 Digoxin(如本院的 lanoxin 隆我心錠)或葉酸等藥物，撒樂腸溶錠會降低這些藥物的吸收，於就診時請告知醫師，由醫師評估是否需調整藥物。

◆ **本藥可能引起哪些副作用?當發生時該如何處理?**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏反應: 全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。

*藥物性肝損傷: 皮膚變黃(黃疸)。

*骨髓抑制: 血球數值異常、嚴重感染或異常出血(牙齦流血、身上莫名瘀青)。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*光敏感、血尿、噁心、嘔吐、食慾不振、消化不良、腹痛、頭痛、頭暈、暈眩、耳鳴。