

Terbinafine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Terbinafine	Camisan®	克黴先錠	250 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療皮膚黴菌感染(甲癬、髮癬)。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 口服投予，通常一天一次，治療療程依感染型態及嚴重度而定。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 禁用於對克黴先錠成分或賦形劑過敏者。
 2. 建議懷孕婦女不要使用，除非對母體的好處明顯超過對胎兒的潛在風險。
 3. 3歲以下的孩子，不建議使用。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 15-30°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服藥前及服藥期間請**定期量測肝功能**及注意身體狀況(無理由的噁心倦怠、食慾缺乏)。
 2. 如檢查出肝功能不正常或病人有明顯症候，如黃疸、茶尿、大便顏色蒼白，應停用本藥。
 3. 當病人使用克黴先錠治療時，為了預防再感染，良好的衛生習慣是必須的，如:內衣、襪子、鞋子要經常更換。
 4. 懷孕婦女或計劃哺乳的婦女，使用前請先告知您的醫師。
 5. 此藥會跟其他藥物有交互作用，有服用其他藥物，需先告知醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用?當發生時該如何處理?**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - *過敏性休克: 血壓驟降、臉色蒼白、冷汗、意識模糊、呼吸困難、心跳加快。
 - *嚴重的皮膚反應(發疹): 疹子伴隨發燒、喉嚨痛、或是黏膜受損。
 - *肝指數過高(肝毒性): 眼睛變黃(黃疸)、皮膚發黃、尿液呈深褐色。極度疲倦、食慾不振、右上腹疼痛。
 - *血球數值異常: 白血球減少、血小板減少。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
 - *噁心、嘔吐、腹痛、消化不良、味覺改變或味覺喪失。頭痛。