

## Amoxicillin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
amoxicillin	Amoxicillin	安謀黴素膠囊	500 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
治療葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。
- ◆ **用量與用法：**
  1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
  2. 如果拉肚子嚴重，可以補充益生菌，或隨餐服用減輕不適。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
  1. 已知對 amoxicillin 或本品任何賦形劑過敏之病人。
  2. 傳染性單核球增多症(EB 病毒)病患不可使用。

(\*單核球增多症初期常見症狀：嚴重喉嚨痛、發燒、淋巴結腫大。)
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
  1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
  1. 儲存環境：室溫 25°C 以下。
  2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
  1. 若您曾對「盤尼西林」或其他同類抗生素(如：頭孢菌素 Cephalosporins)過敏，請務必告知醫師。
  2. 抗生素不是吃越久越好。如果吃藥期間發現舌頭長白斑(鵝口瘡)或是私密處異常搔癢，代表身體長黴菌了，要趕快回診。
  3. 如果傳染性單核球增多症病患服用到此抗生素，可能導致紅斑疹，通常在服藥後的 5 - 10 天才慢慢出來，會非常癢且不舒服。萬一已經吃了藥且出疹，請立即停藥。這類紅疹通常在停藥後 1-2 週內會自行消退，可以使用抗組織胺來緩解搔癢。這其實與免疫過度反應有關，與過敏無關，雖然症狀相似。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
  1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
    - \*嚴重過敏：呼吸困難或感覺喉嚨緊縮。臉部、嘴唇、舌頭異常腫脹。
  2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
    - \*腸胃道症狀：拉肚子、噁心、嘔吐。