

## Cefadroxil 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Cefadroxil	Cefadroxil	賜福得修膠囊	500 毫克/膠囊

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
革蘭氏陽性菌及陰性菌所引起之感染症。
- ◆ **用量與用法：**
  1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
  2. 未經醫師允許，即使覺得好轉，請勿自行停藥。
  3. 為了減少胃腸道不適，通常**建議飯後服用或隨餐服用**。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
  1. 曾對頭孢菌素 Cephalosporin 系製劑有過敏反應之患者，不可使用本劑。
  2. 對盤尼西林 Penicillin 製劑有過敏反應之患者(因臨床及實驗室均有 Penicillin 與 Cephalosporin 部分交互過敏之報告)。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
  1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
  1. 儲存環境：室溫 25°C 以下。
  2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
  1. 長期使用本劑，可能引起非感受性微生物過度繁殖，像如果吃藥期間突然開始嚴重拉肚子、嘴巴破(白斑)或私密處不適，要趕快回診。
  2. 高度腎臟機能不全之患者，宜慎重投予。
  3. 服用本劑，可能**有假性 Coomb's test 反應發生**。如果最近需要抽血或輸血，請一定要告訴醫護人員您正在服用『頭孢菌素』，以免血液檢查結果判讀錯誤。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
  1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
    - \*過敏反應：全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。
    - \*嚴重的皮膚不良反應：如多形性紅斑、史蒂文生氏-強生症候群(Stevens-Johnson syndrome)/毒性表皮性壞死溶解症(toxic epidermal necrolysis)。
    - \*偽膜性結腸炎(極少數人)：一天拉超過 3-5 次，血便或肚子劇痛。糞便帶有黏液、膿，或有特殊的惡臭。
  2. 以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
    - \*噁心、拉肚子、排尿困難等。
    - \*性器搔癢/腫炎：上述因非感受性微生物過度繁殖，像黴菌過多而導致私密處不適。請勿自行停藥應就診告知醫生目前服用的相關藥物。可掛婦產科(女性)或泌尿科(男性)。醫師通常會開立抗黴菌藥膏或塞劑。