

Cefuroxime 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Cefuroxime	Ceflour	喜華膜衣錠	250 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
對廣範圍的革蘭氏陽性及革蘭氏陰性細菌有效，適用於上、下呼吸道、生殖泌尿道、皮膚、軟組織及淋病等感染症。
- ◆ **用量與用法：**
應於飯後服用，以期可達最佳之吸收。錠劑味苦建議整顆吞服。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
禁用於對頭孢子菌抗生素或任何賦形劑會過敏的病人。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 25°C 以下。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 在使用廣效性抗生素期間或之後，輕微拉肚子通常沒關係，可以搭配益生菌。若出現嚴重之腹瀉，應考慮它是偽膜性結腸炎之可能性。
 - 1-a. 留意嚴重腹瀉：若在服藥期間或停藥後，出現嚴重水瀉、血便、劇烈腹痛或發燒，請立即停藥並回診。
 - 1-b. 不可自行吃止瀉藥：若懷疑是抗生素引起的腸炎，請勿自行服用強效止瀉藥，這會讓毒素留在腸道內無法排出，使病情更嚴重。
 2. 由於會從母乳中分泌，因而對於哺乳中的母親，投與時要謹慎。
 3. 妊娠初期 應小心使用。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - *過敏反應：皮膚起紅疹、莫名搔癢、甚至出現氣喘或呼吸不順。
 - *偽膜性結腸炎：一天拉超過 3-5 次，血便或肚子劇痛。糞便帶有黏液、膿，或有特殊的惡臭。
 - *肝臟酵素上升：異常疲倦、食慾不振、尿液顏色變深(像濃茶)、眼白或皮膚發黃。
 2. 以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
 - *腹瀉、頭痛、噁心、嘔吐。