

## Temozolomide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Temozolomide	Tamos®	特莫斯膠囊	20 毫克/膠囊
			100 毫克/膠囊

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

治療復發性或惡化之惡性神經膠質瘤，例如多形神經膠母細胞瘤或退化性星狀細胞瘤。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 應空腹服用，在用餐前至少一小時口服投予。

3. 應伴隨一整杯開水整粒吞服，絕對不可以打開膠囊或咀嚼服用。

\*\*如果膠囊破損，應避免皮膚或黏膜接觸到藥粉。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 過敏。

2. 亦禁用於對 Dacarbazine(DTIC)曾發生過敏反應的病人。

3. 禁用於懷孕或授乳的婦女。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

◆ 如果錯過一劑，病人應在同一天記起時盡快服藥，並在隔天的平常時間服用下一劑。病人不應在同一天服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 特莫斯膠囊通常會引起噁心和嘔吐，建議先給予止吐劑預防。

2. 服藥期間應嚴格物理防曬(遮陽傘、長袖)，減少斑點產生。

3. 如有肝臟疾病，應告知您的醫師，由醫師評估是否可使用。

4. 在療程中間，須重複檢測肝功能；所有病人在每次療程結束時，皆須再測量肝功能。對於嚴重肝功能異常的病人，醫師須評估繼續治療的利弊。肝毒性可能於治療結束後數週出現。

5. 育齡婦女在接受治療期間應避免懷孕，從接受治療持續至最後一次給藥後至少 6 個月內採取有效避孕措施。

6. 授乳的婦女應停止授乳或停用特莫斯膠囊。

7. 建議男性治療期間持續至最後 1 次給藥後至少 3 個月內不要捐獻精液。

\*\*建議應在治療前以冷凍保存法保存精子，因為治療可能會造成不可逆性的不孕。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

\*過敏：若服藥後皮膚出現紅疹、發癢或局部腫脹，呼吸困難、胸悶或臉部嘴唇極度腫脹。

\*血栓相關：單側下肢(小腿)突然腫脹、疼痛、發熱；或突然發生胸痛、劇烈呼吸困難。

\*出血與感染：莫名青紫色瘀青、牙齦或鼻孔出血不止、或持續發燒(>38.5°C)。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/22 修訂】

BTC00ED43-02

**Temozolomide 口服製劑衛教單張**

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Temozolomide	Tamos®	特莫斯膠囊	20 毫克/膠囊
			100 毫克/膠囊

\*視力與神經問題：視力模糊、複視、視野缺損。或出現痙攣、言語不清、單側肢體無力。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

\*厭食、頭痛、痙攣、便秘、噁心、嘔吐、禿髮、皮疹、疲勞。

\*光敏感、色素沈著異常(皮膚變黑或出現斑點)、聽力受損。



藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/22 修訂】

BTC00ED43-02