

Upadacitinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Upadacitinib	Rinvoq®	銳虎持續性藥效錠	15 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

可用於治療類風濕性關節炎、乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎、異位性皮膚炎、潰瘍性結腸炎、克隆氏症等。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 隨餐或不隨餐服用均可。應整粒吞服，不應剝半、攪碎或咀嚼。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其任何賦形劑過敏者禁止服用。
2. 目前患有心肌梗塞或中風者。
3. 正患有結核病(具傳染力或症狀明顯)或皮蛇(帶狀疱疹)者。
4. **懷孕**中的女性不宜使用。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時盡快服用;若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 如果正發生嚴重感染(包括局部感染)的病人應避免使用此藥。治療期間與治療後，應密切監測病人是否出現感染徵兆與症狀。
2. 正在患有**活動性結核病(具傳染力或症狀明顯)**的病人絕對不能使用銳虎持續錠。
3. 用藥前必須先進行結核病篩檢。如果曾有潛伏性結核病且未完成療程，或屬於高風險族群者，醫師可能會要求在開始銳虎持續錠前，先接受一段時間的抗結核藥。即使篩檢陰性，治療期間若出現疑似結核症狀(如長期咳嗽、發燒、盜汗)，請立即告知醫師。
4. 若病人出現**帶狀疱疹**，應考慮暫時中斷治療直到疱疹緩解為止。
5. 如果治療期間檢查出 B 肝病毒數值異常，請回診諮詢肝膽專科醫師。
6. 不建議在治療期間或該治療前使用活性減毒疫苗，如須施打疫苗請諮詢下醫生。
7. 服藥期間應完全**避免食用含有葡萄柚**之食物或飲品，像**柚子、苦橙及楊桃**也不要吃。
8. 具生育能力的**女性**於治療期間和服用最後一劑藥物後 4 週內，得使用有效的**避孕**措施。
9. 建議在治療期間以及最後一次用藥後的 6 天內都**不宜哺乳**。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏反應: 全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。

*肝指數升高: 出現黃疸、茶色尿或右上腹悶痛。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/22 修訂】

BTC00ED44-02

Upadacitinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Upadacitinib	Rinvoq®	銳虎持續性藥效錠	15 毫克/錠

*嚴重感染：出現不明原因的發燒、嚴重頭痛、咳嗽。

*疑似皮蛇(帶狀疱疹)：全身起皮疹，或是皮膚出現成群的小水泡且伴隨刺痛。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*上呼吸道感染、噁心、貧血、疲倦、周邊水腫。



藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/22 修訂】

BTC00ED44-02