

Bethanechol 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Bethanechol	Wecoli®	胃可麗錠	25 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

可用於治療手術後、產後之非阻塞性尿液滯留。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 最好**空腹**給藥(**飯前 30 分鐘或飯後 2 小時**)，若飯後立即用藥，可能會感覺噁心和嘔吐。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 不適用於對胃可麗錠內任何成分過敏。

2. 如有甲狀腺機能亢奮症，胃潰瘍，潛伏性或是活躍的支氣管氣喘，明顯之心跳徐緩或是低血壓，血管舒張收縮不穩，冠狀動脈疾病，癲癇以及帕金森氏症等疾病，不應使用。

3. 如果**腸胃道有阻塞**，膀胱頸阻塞，痙攣性腸胃不適，腸胃道有急性發炎損傷，腹膜炎，或是明顯之迷走神經過度興奮，不應使用。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

舉例：三餐飯前胃可麗錠 1 顆：

▷剛開始吃飯時想起：趕快補吃。雖然空腹吸收最好，但只要注意是否會反胃即可。

▷飯後 1 小時內想起：建議等飯後 2 小時再補吃，這樣能維持藥物的吸收，也比較不會不舒服。

▷已經快到下一餐：直接放棄這劑。等到下一餐的「飯前」再吃正常劑量，不要一次吃兩顆。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：**25°C 以下**，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. **需注意暈眩、頭重腳輕、或昏倒**的情形亦可能會發生，特別是從坐姿或是臥姿突然站起時。

2. 注意**用藥過量**的早期徵兆是：腹部不適、流口水、皮膚潮紅(發熱感)、流汗、噁心以及嘔吐。

3. 本藥可能導致視力模糊(縮瞳)，請**避免於視線不佳時駕駛或操作機械**。

4. 此藥物使用於懷孕婦女其安全性尚未確立，若妳計畫懷孕或已懷孕或正在哺乳，就診時請務必告知醫師，由醫師評估是否可使用。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏反應:皮膚出現紅疹、發癢或局部腫脹，呼吸困難、胸悶或臉部嘴唇極度腫脹。

*呼吸與心臟：突然心跳加快、胸悶、氣喘發作或呼吸喘鳴聲。

*神經與血壓：嚴重頭暈(血壓下降)、意識不清、甚至發生抽搐(癲癇)。

*腹部劇痛：嚴重的肚子絞痛或結腸部位劇烈疼痛。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*噁心、肚子悶痛(痙攣)、拉肚子。容易流汗、流口水或流眼淚。頻尿、尿急。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/23 修訂】

BTC00EE09-02