

Fentanyl 外用貼片衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Fentanyl	Opiodur	歐必德穿皮貼片劑	12 mcg/hr,
			25 mcg/hr

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。

◆ **用量與用法：**

1. **一片貼 72 小時 (3 天)**。醫師會依個別狀況調整貼片量，請依醫師指示使用。

2. 每次貼上或撕下貼片都應記錄於使用紀錄表。**紀錄表**應於回診時攜回，先給醫師檢視用藥情況並蓋章後，**連同使用過的廢片**交給藥局(正好貼於身上的便不用)。

*如果有不須使用的**新片**務必交還給藥局。

✚ **黏貼部位：**

- ✧ 皮膚需清潔、乾燥、無傷口。優先選擇軀幹或上臂無毛的區域；若需除毛，請以剪刀修剪代替刮剃，以防皮膚受損。
- ✧ 可貼於前胸、後背、上手臂、大腿等平坦處。對兒童而言，上背部不易移除是最佳部位。
- ✧ 每次應更換黏貼部位以減少皮膚不適。同一部位應相隔數日。
- ✖ 不可貼於發紅、受刺激、割傷的皮膚或放射治療部位。
- ✖ 不可貼於剛擦乳霜、乳液、或粉末的皮膚。
- ✖ 不可貼於會因穿著而磨擦掉貼片部位或皮膚皺摺處。

✚ **使用方法：**

*將黏貼部位用清水洗淨，並待皮膚完全乾燥。勿用肥皂、油、乳液清洗。

-> 打開外包裝並取出貼片，貼片不可剪裁。***貼片不可切割或破壞，以免影響藥物釋出。**

-> 撕除膠膜並貼於皮膚，用手掌輕壓 **30 秒**，確保貼片完全緊貼於皮膚，也可使用透氣膠帶黏貼於貼片邊緣。

-> 以清水洗淨雙手，並記錄貼片貼上時間於使用紀錄表。

-> **72 小時(3 天)**之後，撕下貼片放入原包裝袋(不可丟棄，回診時應連同記錄表繳回藥局)。

-> 以清水洗淨雙手，並記錄貼片撕除時間於使用紀錄表。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對 fentanyl 或賦形劑過敏之病患。

◆ **忘記使用時該如何處理？**

1. 想起時盡快使用，**72 小時(3 天)**後再更換。

2. 除非醫師指示同時使用二片，否則不可同時貼二片。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 **25°C** 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/7 修訂】

BTC00EH27-02

Fentanyl 外用貼片衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Fentanyl	Opiodur	歐必德穿皮貼片劑	12 mcg/hr,
			25 mcg/hr

◆ 注意事項：

1. 若貼片不慎脫落或黏貼部位產生刺激，可撕下重新黏貼於不同部位，視情況可使用透氣膠帶加強固定。
2. 貼片使用期間可洗澡(以淋浴方式)、游泳，但避免貼片長時間接觸熱源，如加熱墊、電毯、加熱水床、加熱燈、密集日光浴、熱水瓶、長時間的熱水浴、芬蘭蒸氣浴及熱循環水療。
3. 體溫上升可能會導致過多藥物進入您體內。若您發燒，請告知您的醫師，若發生嚴重嗜睡、呼吸困難、呼吸過緩或淺呼吸，請撕下貼片立即就醫。
4. 使用本藥應避免和酒精或中樞神經抑制劑(安眠、過敏、感冒藥等)併服，因會增加中樞神經方面的副作用，如嗜睡。
5. 本藥可能會導致嗜睡、頭昏、暈眩，尤其是初次使用。不要開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
6. 長期使用可能會發生便秘的情形，多吃富含纖維素的食物及適度的運動可幫助改善，若仍不能改善，可與醫師討論是否需要使用軟便劑或瀉劑。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - *呼吸與循環危機：呼吸變得很淺、很慢（每分鐘少於 10 次），或是嘴唇、指甲發紫。突然站不穩、眼前發黑、測量血壓明顯低於平常值。
 - *神經系統異常：叫不醒、拍打沒反應，或是雖然醒著但說話語無倫次、不知道自己在幹嘛。天旋地轉到無法行走，甚至伴隨劇烈嘔吐。
- ◇ 如果發現上述嚴重症狀：嚴重嗜睡(叫不醒)、呼吸變慢、發紫、意識模糊，第一時間除了叫救護車，要立刻找到貼片並撕掉，避免藥物持續吸收。
 - *如果超過 8 小時無法排尿，可能導致急性尿滯留或腎損傷，需就醫導尿。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
 - *皮膚紅疹、皮膚搔癢、噁心、嘔吐。