

Vadadustat 口服製劑衛教單張

| 學名 | 商品名 | 中文名 | 含量/劑型 |
|------------|---------|------|----------|
| Vadadustat | Vafseo® | 衛復守錠 | 300 毫克/錠 |

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療透析成人病人因慢性腎臟疾病導致之貧血。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 可隨餐或空腹口服使用，且應完整整顆吞服，不可咀嚼。

3. 衛復守錠可在透析之前、期間或之後任何時間服用。

✚ **與某些藥物應間隔服用：**

- 衛復守錠應在口服鐵質補充劑或主要成分含鐵的藥品或含鐵磷結合劑之前至少 1 小時服用。
- 可能與多價陽離子形成螯合物，衛復守錠應在非含鐵磷結合劑或其他主要成分含多價陽離子(例如鈣、鎂或鋁)的藥品之前至少 1 小時或之後至少 2 小時服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對有效成分或任何賦形劑曾有過敏病史的病人。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 如果錯過一劑，病人應在同一天記起時盡快服藥，並在隔天的平常時間服用下一劑。病人不應在同一天服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 使用前**評估血栓栓塞的風險**，包括腦梗塞、心肌梗塞和肺栓塞，以及是否有血栓栓塞病史，審慎考量治療適當性。應密切監測疑似血栓栓塞的表徵和症狀，如果出現立即就醫。

2. 吃這顆藥是為了改善貧血，但血紅素只要補到『夠用、不需要輸血』的程度就好。補過頭反而會讓血液太濃稠，所以我們會用最低的有效劑量來治療。

3. 治療初期，**兩週一次監測血紅素濃度**直到穩定，之後每月監測一次。

4. 慢性腎功能不全病人服用衛復守錠，可能伴隨高血壓惡化，治療之前和之後**定期監測血壓**，並記錄數值提供醫師參考。

5. **懷孕期間最好避免使用。**

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- *過敏反應：服藥後皮膚出現紅疹、發癢或局部腫脹，呼吸困難、胸悶或臉部嘴唇極度腫脹。
- *血栓徵兆：突然單側肢體腫痛(可能是深層靜脈血栓)；突然胸痛、呼吸急促(可能是肺栓塞)；突然說話不清、半身無力、視力模糊(可能是中風前兆)。
- *嚴重血壓與神經問題：血壓劇烈升高，伴隨嚴重頭痛、頸部僵硬或視力改變。意識混亂、全身痙攣或癲癇發作。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/23 修訂】

BTC00EL14-02

Vadadustat 口服製劑衛教單張

| 學名 | 商品名 | 中文名 | 含量/劑型 |
|------------|---------|------|----------|
| Vadadustat | Vafseo® | 衛復守錠 | 300 毫克/錠 |

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*腹瀉、頭痛、噁心、嘔吐、便秘、咳嗽、疲勞。



藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/23 修訂】

BTC00EL14-02