

Budesonide/Glycopyrronium/Formoterol Aerosphere 吸入製劑衛教單張

學名/含量	商品名	中文名	規格
每噴含：Budesonide 160 微公克+ Glycopyrronium 7.2 微公克+ Formoterol 5 微公克	BREZTRI® Aerosphere	必肺暢氣化噴霧劑	120 噴/瓶

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
可使支氣管擴張，改善呼吸問題，適用於 **中至重度慢性阻塞性肺病** 病人的維持治療。
[必肺暢氣化噴霧劑並未核准用於緩解急性支氣管痙攣或治療氣喘]

◆ **用量與用法：**

*請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

✚ **使用前的劑量充填：**

1. 第一次使用，請遠離臉部，朝空中按壓 **4 次**，每次按壓前應充分搖勻。
2. 如果超過 7 天未使用吸入器、吸入器曾掉落，或在每週一次的沖洗清潔後，請再度裝填吸入劑：遠離臉部，朝空中按壓 **2 次**，每次按壓前應充分搖勻。

✚ **每日使用步驟：**

1. 移除吸嘴上的蓋子，確認吸嘴內無異物。



2. 如果處方劑量超過 1 次，請於 **30 秒至 1 分鐘**後再重複上圖步驟。
3. 用畢後，請將蓋子蓋回吸嘴。
4. 請 **以水漱口並漱至喉嚨，然吐掉**。

✚ **吸入器清潔：**




*每週清潔吸入器一次，以避免噴嘴被殘留藥物塞住。

1. 將藥罐從吸入器取出，藥罐請勿清潔或使其受潮。
2. 將蓋子從吸嘴上取下。
3. 垂直握住吸入器在水龍頭下沖洗約 **30 秒**；吸入器轉向使水從吸嘴處流入約 **30 秒**。
4. 盡可能將吸入器甩乾。
5. 查看吸入器及吸嘴以確保殘留的藥物被徹底洗掉，若發現殘留物，請重複清潔步驟 **3~5**。
6. 吸入器自然風乾一夜，待其乾燥後將藥罐裝回吸入器。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150【2026/4/20 修訂】

Budesonide/Glycopyrronium/Formoterol Aerosphere 吸入製劑衛教單張

學名/含量	商品名	中文名	規格
每噴含：Budesonide 160 微公克+ Glycopyrronium 7.2 微公克+ Formoterol 5 微公克	BREZTRI® Aerosphere	必肺暢氣化噴霧劑	120 噴/瓶

清潔 1	清潔 2
<p>將藥罐從吸入器中取出。 請勿清潔藥罐，並保持其乾燥 (勿使其受潮)。</p> 	<p>將蓋子從吸嘴上取下。</p> 
清潔 3 (沖洗)	清潔 4
<p>垂直握住吸入器在溫水龍頭下沖洗約30秒；接著將吸入器 轉向，使水從吸嘴處流入約30秒。</p> 	<p>盡可能將吸入器甩乾。請勿使用毛巾或衛生紙擦乾。</p> 

✦ 勿在吸入器仍潮濕的情況下將藥罐裝回。裝回時勿大力擠壓藥罐以免藥液噴出。

✦ 餘藥確認：

1. 吸入器頂部附有計數器，其上的箭頭指出吸入器中剩下多少劑量(噴)。
2. 箭頭進入黃色區域，表示剩下約 20 個劑量，此時應準備再次取得新的藥物。
3. 箭頭進入紅色區域，表示剩下 0 個劑量，請將其丟棄，即使仍能噴出藥液。



◆ 藥品儲存：

1. 存放於攝氏 25 度以下之陰涼乾燥處，勿放於浴室等潮濕處。
2. 使用或存放時請勿接近熱源或明火處，溫度超過 49°C 可能造成爆裂。
3. 自鋁箔袋中取出後，僅能保存 3 個月，3 個月後未用畢請丟棄。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對本品任一成分過敏者。
2. 避免過度使用必肺暢氣化噴霧劑，且避免與其他長效乙二型(β_2)交感神經致效劑合併使用。

◆ 忘記用藥時該如何處理？

盡可能在您想起時立刻補齊這一個劑量，但若幾乎到了使用下一個劑量的時間，那就略過並恢復到定期的用藥時間表。千萬別為了補上錯過的劑量而使用雙倍劑量。

◆ 注意事項：

1. 不應基於緩解急性症狀而使用額外劑量，急性症狀發作時應使用含速效乙二型(β_2)交感神經致效劑的吸入劑，如備勞喘、備喘全等吸入劑。
2. 本藥可能反常性的引起支氣管痙攣，給藥後若發生喘、呼吸困難，請立即停藥就醫。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150【2026/4/20 修訂】

Budesonide/Glycopyrronium/Formoterol Aerosphere 吸入製劑衛教單張

學名/含量	商品名	中文名	規格
每噴含：Budesonide 160 微公克+ Glycopyrronium 7.2 微公克+ Formoterol 5 微公克	BREZTRI® Aerosphere	必肺暢氣化噴霧劑	120 噴/瓶

3. 對罹患嚴重心臟疾病的患者，若出現胸痛或心臟病惡化的症狀，應尋求醫師的建議。
4. 用藥後可能會有口乾與念珠菌感染的風險，應適時漱口和飲水。
5. 應注意是否出現急性狹角性青光眼的表徵和症狀：例如眼睛疼痛不適、視力模糊、虹暈幻視、有色影像伴隨結膜充血造成眼睛發紅、角膜水腫，有這些症狀應立即就醫。長期使用吸入性類固醇可能增加某些眼部問題的風險：白內障或青光眼，應考慮定期接受眼科檢查。
6. 尿液滯留、前列腺肥大或膀胱頸阻塞病人請小心使用，若有尿液滯留惡化情形：排尿困難、疼痛，請立即請教醫師。
7. 使用本藥可能會使血糖增高，糖尿病病人應小心使用，經常監測血糖。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- *嚴重過敏反應：如呼吸或吞嚥困難，舌頭、嘴唇和臉部腫脹、蕁麻疹。
- *口腔白色念珠菌感染：口腔或喉嚨出現瘡或白斑(通常因吸藥後未徹底漱口引起)。
- *奇異性支氣管痙攣：吸藥後反而出現喘、呼吸困難加劇。
- *胸腔不適：胸悶、胸痛、呼吸困難加劇。
- *心血管系統：快速、劇烈或不均勻的心跳(心律不整風險)。
- *急性症狀：眼睛疼痛、視力模糊、視覺有光暈或彩色影像。
- *慢性惡化：狹角性青光眼惡化及白內障。
- *全身感染症狀：如發燒、畏寒或其他類似肺炎的前兆(COPD 患者需特別注意肺部感染)。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

- *咽喉刺激、口乾、神經質、震顫、頭暈、失眠、頭痛、頭暈、瘀青、噁心、高血糖。