

Hydroxypropylmethylcellulose 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Hydroxypropylmethylcellulose	Artelac	愛特淚點眼液	3.2 毫克/毫升, 10 毫升/瓶

- ◆ **用途：**(一種藥可能有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。

- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
曾因本藥成分引起過敏的人。



- ◆ **用量與用法：**

1. [請不要戴隱形眼鏡] 使用前請先將手洗淨擦乾。
2. 打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。
3. 手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕拉下眼皮，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩，然將眼藥水點在眼窩穹窿內，1次投予1滴，注意瓶嘴不要接觸到眼睫毛或眼睛，避免藥水瓶受到污染。然閉上眼睛，同時用手指頭輕壓住眼角內側(鼻側的鼻淚管開口)2分鐘。一天可用3至4次，一次1至2滴。
4. 用畢，即蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，然洗手。
5. 若需點兩種以上眼藥水時，請相隔5分鐘以上再重複上述步驟點第二種眼藥水。

- ◆ **使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治**

1. 連續使用三天症狀沒有改善。
2. 使用後產生眼睛劇痛，持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。

- ◆ **注意事項：**

1. 以下情形，請勿繼續使用：
 - 已超過保存期限的眼藥水。
 - 已開瓶28天後。
 - 藥液混濁、變色或出現異物時。
2. 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
3. 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
 - 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔10分鐘以上再用藥膏。
 - 使用兩種眼藥水時，建議間隔5分鐘以上。
 - 配戴隱形眼鏡時，請勿點用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。
4. 投藥後20分鐘內請勿戴軟式隱形眼鏡。

- ◆ **藥品儲存：**

1. 室溫25°C以下陰涼處，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。
3. 未使用時，請保持瓶蓋蓋緊。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/1/27 修訂】

Hydroxypropylmethylcellulose 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Hydroxypropylmethylcellulose	Artelac	愛特淚點眼液	3.2 毫克/毫升, 10 毫升/瓶

◆ 本藥可能引起哪些副作用?當發生時該如何處理?

1. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*視力模糊、眼睛刺激等。



無私奉獻 · 敬舉服務

恩主公醫院
En Chu Kong Hospital

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/1/27 修訂】

BTC00EV51-02