

Olopatadine 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Olopatadine	Patanol	愛特敏點眼液	0.1%, 5 毫升/瓶

- ◆ **用途：**(一種藥可能有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療過敏性結膜炎。

- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
對本品活性成份或任何賦形劑過敏者。

- ◆ **用量與用法：**

1. [請不要戴隱形眼鏡] 使用前請先將手洗淨擦乾。
2. 打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。
3. 手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕拉下眼皮，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩，然將眼藥水點在眼窩窩窿內，1次投予1滴，注意瓶嘴不要接觸到眼睫毛或眼睛，避免藥水瓶受到污染。然閉上眼睛，同時用手指頭輕壓住眼角內側(鼻側的鼻淚管開口)2分鐘。
4. 一天可用2次，一次1滴。
5. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。
6. 若需點兩種以上眼藥水時，請相隔5分鐘以上再重複上述步驟點第二種眼藥水。



- ◆ **注意事項：**

1. 愛特敏點眼液含有防腐劑(benzalkonium chloride)，可能造成眼睛刺激感，且已知會使軟式隱形眼鏡變色，故請避免與軟式隱形眼鏡接觸。使用前應摘除隱形眼鏡，用完藥後等待約至少15分鐘後再進行配戴。
2. 使用點眼液後可能會暫時性視力模糊或有其他的視覺干擾現象，如會影響駕駛或機械操作能力，請待視力清楚後再行駕駛或操作機械。
3. 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
 - A. 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔10分鐘以上再用藥膏。
 - B. 使用兩種眼藥水時，建議間隔5分鐘以上。
4. 點藥後閉合鼻淚管或輕輕閉上眼睛2分鐘，可以減少全身性吸收，降低全身性不良反應和增加局部活性。

- ◆ **藥品儲存：**

1. 室溫 30°C 以下陰涼處，避光、避濕及避熱。未使用時，請保持瓶蓋蓋緊。
2. 開瓶後最多只能存放1個月，逾時請丟棄。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

- ◆ **本藥可能引起哪些副作用?當發生時該如何處理?**

1. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*眼睛異常感覺、視力模糊、乾眼症、眼睛灼熱感、結膜炎、眼瞼水腫、眼痛、眼癢、異物感、角膜炎、眼睛刺痛。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/7 修訂】

BTC00EV52-02