

Acyclovir 乳膏製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Acyclovir	Deherp	庖寧乳膏	50 毫克/1 克；5 克/條

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療單純疱疹病毒引起之皮膚感染。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 已知對 **Acyclovir** 或配方中的賦形劑過敏者。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 本藥品須由醫師處方。
 2. 適量塗抹敷於患部，可每 4 小時塗一次，一天 5 次，可使用 5 天。如未痊癒可連續使用至 10 天。
- ◆ **注意事項：**
 1. 本品僅供皮膚外用，切勿使用於眼睛及黏膜處。
 2. 若孕婦或幼兒須使用，宜審慎評估利弊後再行使用。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲放在 25°C 以下之乾燥處。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用?當發生時該如何處理?**
 1. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*可能發生短暫之灼熱感或刺痛，或有紅斑或輕微乾燥、皮膚剝落、瘙癢等。