

Benzoyl peroxide 外用藥膏衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Benzoyl peroxide	Aczo gel	雅若凝膠	5%, 10g/條

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療尋常性痤瘡(青春痘、面皰)。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示，勿超過建議使用量或使用次數。
 2. 先用於 1~2 個小區域，測試是否會對本藥過敏，若無刺激感發生，再使用本藥。
 3. 將臉洗淨、擦乾，再將藥品輕抹薄薄一層塗於患部。
 4. 剛開始使用時 1 天 1 次，需要時再逐漸增加為 1 天 2 至 3 次。
 5. 若發生乾燥或脫皮，則降低次數為 1 天 1 次或 2 天 1 次。
*如果太乾，可以先擦一點保濕乳液後再點藥。
 6. 請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥任一成分過敏者禁用。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 請儲存於室溫 25°C 以下陰涼處，避免陽光直射。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 本藥僅能使用於痤瘡(青春痘、面皰)部位，不得內服或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。且勿使用於有損傷的皮膚及大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)。
*不要像擦乳液一樣塗滿全臉，否則沒長痘痘的地方會因過度乾燥而脫皮、紅腫。
 2. 塗抹部位應避免陽光曝曬，並避免與其他皮膚刺激原接觸。建議晚上使用。
 3. 正使用其他外用痤瘡(青春痘、面皰)治療藥物或併用其他痤瘡輔助治療者請先諮詢醫師。
 4. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦使用前請先諮詢醫師。
 5. 使用後自覺狀況未改善或更惡化，請立即停藥就醫。
 6. 頭髮、彩色布料沾染本劑會有漂白脫色作用。
- ◆ **可能引起的副作用：**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
*若塗抹處出現異常劇烈搔癢、水泡或紅腫範圍擴散，請立即停藥洗淨，並尋求醫師協助。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
*皮膚發生乾燥、脫皮、刺痛、燒灼感時，經降低使用次數或使用低濃度，刺激感仍未改善。