

**Chlorpheniramine maleate, Lidocaine HCl,
Methyl Salicylate, dl-Menthol, dl-Camphor 外用藥膏衛教單張**

學名	商品名	中文名	規格
Chlorpheniramine maleate, Lidocaine HCl, Methyl Salicylate, dl-Menthol, dl-Camphor.	CB oint Strong	強力施美藥膏	5 克/條

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
暫時緩解尿布疹、蚊蟲咬傷、皮膚搔癢、皮膚炎等症狀。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示，勿超過建議使用量或使用次數。
 2. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
 3. 適量塗抹於患部。
 4. 本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。
 5. 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)。
 6. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥任一成分過敏者禁用。
 2. 曾對阿斯匹靈或水楊酸過敏者。
 3. 蠶豆症(G6PD 缺乏症)患者請勿使用
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 請儲存於室溫 15-30°C 以下陰涼處，避免陽光直射。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
 2. 請勿使用於患部以外，也勿當作預防使用。如使用後自覺狀況未改善或更惡化，請立即停藥就醫。
 3. 不可連續使用超過 7 天。不得大量使用，以避免全身吸收。
 4. 不得長期大面積使用，以免發生水楊酸中毒症狀，如：呼吸困難、發汗、體溫過高、面色潮紅或持續頭痛，一旦發生請諮詢醫師。*擦藥後耳鳴要看醫生。
 5. 3 歲以下如需使用請先諮詢醫生。
 6. 蠶豆症(G6PD 缺乏症)患者請勿使用：本藥膏含有樟腦(Camphor) 與水楊酸類(Methyl Salicylate)的成分，可能誘發溶血反應。
- ◆ **可能引起的副作用：**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - *若塗抹處出現異常劇烈搔癢、水泡或紅腫範圍擴散，請立即停藥洗淨，並尋求醫師協助。
 - *水楊酸效應：耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐、異常出汗、呼吸變得急促等。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/7 修訂】

BTC00EW30-02

**Chlorpheniramine maleate, Lidocaine HCl,
Methyl Salicylate, dl-Menthol, dl-Camphor 外用藥膏衛教單張**

學名	商品名	中文名	規格
Chlorpheniramine maleate, Lidocaine HCl, Methyl Salicylate, dl-Menthol, dl-Camphor.	CB oint Strong	強力施美藥膏	5克/條

*塗抹部位感到刺痛、灼熱感、發紅或輕微發癢。



該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/7 修訂】

BTC00EW30-02